МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения БЕНОКСИ

Регистрационный номер: П N016007/01

Торговое название: БЕНОКСИ

Международное непатентованное название (МНН): оксибупрокаин.

Лекарственная форма: капли глазные

Состав
10 мл раствора содержат:
Действующее вещество: оксибупрокаин гидрохлорид 40 мг,
Вспомогательные вещества: борная кислота 200 мг, хлоргексидина диацетат 1 мг, вода очищенная до 10 мл.

Описание

Прозрачный бесцветный раствор

Фармакотерапевтическая группа: местноанестезирующее средство

КОД АТХ: S01HA02

Фармакологические свойства
Фармакодинамика
Обладает местноанестезирующим эффектом короткого действия, обратимо блокирует чувствительные нервные окончания и проводники; проникает через мембрану нервных клеток, нарушает трансмембранный транспорт ионов (особенно натрия), уменьшает поток импульсов в ЦНС, не оказывает влияния на величину зрачка глаза и его способности к аккомодации. Легко всасывается через слизистые оболочки.
Поверхностная анестезия конъюнктивы и роговицы после применения глазных капель наступает через 30-60 секунд и продолжается 10-20 минут.

Показания к применению
Поверхностная анестезия роговицы и конъюнктивы при мелких хирургических вмешательствах (например, для удаления поверхностно и глубоко расположенных инородных тел), при тонометрии, гониоскопии или других диагностических обследованиях; перед проведением субконъюнктивальных и ретробульбарных инъекций.

Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам (в том числе к другим местным анестетикам группы эфиров парааминобензойной кислоты или амидов), детский возраст (до 2 лет).

Беременность и период лактации
Клинического опыта по применению препарата при беременности и в период лактации недостаточно. Применение препарата Бенокси при беременности и в период грудного вскармливания возможно только в случаях, когда ожидаемая польза терапии для матери превышает потенциальный риск для плода или грудного ребенка.

Способ применения и дозы
Местно. В промежутке между отдельными введениями препарата глаза должны быть закрыты.
Анестезия роговицы и конъюнктивы.
Для удаления инородных тел, находящихся на поверхности: в коньюнктивальный мешок по 1 капле 3 раза в течение 5 минут.
Для удаления глубоко расположенных инородных тел - по 1 капле 5-10 раз с интервалом 30 - 60 секунд.
Перед проведением субконъюнктивальной и ретробульбарной инъекций: по 1 капле 3 раза в течение 5 минут.
Для проведения тонометрии, гониоскопии и других обследований: по 1 - 2 капли.

Побочное действие
Возможно: кратковременное ощущение покалывания, жжения и гиперемия конъюнктивы; повреждения роговичного слоя эпителия, инфильтрация стромы роговицы; аллергические реакции в области ресниц и конъюнктивы.
Редко: кератит и эрозия поверхности роговицы.

Передозировка
Симптомы: раздражение, бессонница, тошнота, рвота, судороги, нарушения дыхания, кома, артериальная гипотензия, остановка сердца.
Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами
Препарат усиливает эффект сукцинилхолина и симпатомиметиков и снижает действие сульфаниламидов и бета-адреноблокаторов.
В состав препарата Бенокси входит консервант хлоргексидин диацетат, который несовместим с раствором флуоресцеина (при одновременном применении выпадает осадок). Также препарат несовместим с нитратом серебра, с веществами щелочной природы и солями ртути.

Меры предосторожности при применении
Препарат предназначен только для инстилляций в коньюктивальный мешок. Не использовать для инъекций.
Не предназначен для длительной терапии в комплексном лечении заболеваний глаз.
Продолжительное, многократное и длительное применение (как и других местных анестетиков), может привести к стабильному помутнению роговицы.

Влияние на способность управлять автомобилем и другими механизмами
После применения препарата Бенокси управлять автотранспортом и выполнять работы, требующие высокой скорости психомоторных реакций, разрешается не ранее чем через один час.

Форма выпуска
Капли глазные 4 мг/мл. Пластиковый флакон-капельница по 10 мл с навинчиваемой пластиковой пробкой в картонной пачке вместе с инструкцией по применению.

Условия хранения
В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25° С.
Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности
2 года.
Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.
Флакон после вскрытия годен к употреблению в течение 14 дней. После закапывания необходимо немедленно и плотно закрыть флакон.

Условия отпуска из аптек
По рецепту.

Производитель

«Унимед Фарма с. р.о.», Словацкая Республика

821 05, Братислава, Ориешкова 11

Тел: ++ 421 2 4333 3786/**Факс:** ++ 421 2 4363 8743.

Претензии потребителей направлять по адресу:
Представительство фирмы «Унимед Фарма с.р.о.»
105058, Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, корп. 50
тел.: (495) 725 05 28.

Уполномоченный представитель Н.С. Степутенко