МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛП-000070-011121
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению лекарственного препарата

Викс Синекс
наименование лекарственного препарата

спрей назальный дозированный, 25 мкг/доза
лекарственная форма, дозировка

Тева Чешские Предприятия с.р.о., Чешская Республика
наименование производителя, страна

Изменение № 3

Дата внесения Изменения «____» 011121 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Показания к применению Для облегчения носового дыхания при «простудных» заболеваниях или вирусных инфекциях верхних дыхательных путей, синусите, рините любой этиологии.	**Показания к применению** – Острые респираторные заболевания с явлениями ринита (насморка); – острый аллергический ринит; – обострение вазомоторного ринита; – для восстановления дренажа при воспалении придаточных пазух полости носа (синуситах), евстахиите, среднем отите; – для устранения отёка перед диагностическими манипуляциями в носовых ходах.
Противопоказания к применению – повышенная чувствительность к компонентам препарата;	**Противопоказания** – гиперчувствительность к оксиметазолину и другим компонентам препарата;

Старая редакция	Новая редакция
– атрофический (сухой) ринит, воспаление кожи и слизистой оболочки области преддверия носа; – прием ингибиторов моноаминооксидазы (МАО) в течение предшествующих 2-х недель и в течение 2-х недель после их отмены; – закрытоугольная глаукома; – состояние после транссфеноидальной гипофизэктомии; – детский возраст до 6 лет; – обострение ишемической болезни сердца или острая сердечная недостаточность; – хирургические вмешательства на твердой мозговой оболочке (в анамнезе).	– атрофический ринит; – воспаление кожи и слизистой оболочки области преддверия носа; – приём ингибиторов моноаминооксидазы (МАО) в течение предшествующих 2-х недель и в течение 2-х недель после их отмены; – закрытоугольная глаукома; – состояние после транссфеноидальной гипофизэктомии; – детский возраст до 6 лет; – обострение ишемической болезни сердца или острая сердечная недостаточность; – хирургические вмешательства на твердой мозговой оболочке (в анамнезе).
Способ применения и дозы Интраназально. Взрослым и детям старше 10 лет: по 1-2 впрыскивания в каждый носовой ход не более 2 - 3 раз в день. Детям от 6 до 10 лет: по 1 впрыскиванию в каждый носовой ход не более 2-3 раз в день. Продолжительность лечения: Не рекомендуется применять препарат более 7 дней. При частом или длительном использовании препарата чувство затруднения носового дыхания может появиться вновь или ухудшиться. При	**Способ применения и дозы** Интраназально. Взрослые и дети старше 6 лет: по 1 впрыскиванию в каждый носовой ход 2-3 раза в день. Препарат применяется от 3 до 5 дней. В рекомендованной дозе без консультации с врачом применять препарат не более 7 дней подряд. Если симптомы усиливаются или улучшение не наступает в течение 3-х дней, необходимо проконсультироваться с врачом. Повторный курс препарата возможен только спустя несколько дней, в течение которых препарат не применялся.

Старая редакция	Новая редакция
появлении этих симптомов следует прекратить лечение и обратиться к врачу. При впрыскивании не следует запрокидывать голову назад и распылять в положении лежа.	При частом и длительном применении препарата ощущение «заложенности» носа может появиться вновь или ухудшиться. В этом случае следует прекратить лечение и обратиться к врачу. При впрыскивании не следует запрокидывать голову назад и распылять в положении лежа.

Старший менеджер по регуляторным вопросам



И. В. Тымковская