МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Окситоцин Гриндекс
наименование лекарственного препарата

раствор для внутривенного и внутримышечного введения 5 МЕ/мл
лекарственная форма, дозировка

АО «Гриндекс», Латвия /
произведено АО «Санитас», Литва, или Эйч Би Эм Фарма с.р.о., Словакия
наименование производителя, страна

Изменение № 2

Дата внесения Изменения «18» 07 2012 г.

Старая редакция	Новая редакция
Беременность и кормление грудью Раздел отсутствует	**Беременность и кормление грудью** В первом триместре беременности окситоцин применяют только при спонтанных или индуцированных абортах. Влияние окситоцина на плод изучено недостаточно, случаев тератогенного действия не описано. В молоко матери препарат проникает в небольших количествах. При применении окситоцина для остановки маточного кровотечения к кормлению грудью следует приступать по завершению курса лечения окситоцином.
Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами Раздел отсутствует	**Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами** Окситоцин не влияет на способность управлять транспортными средствами и механизмами, работа на которых связана с повышенным риском травматизма. Женщине, у которой начались схватки, не следует вести машину.

Старая редакция	Новая редакция
Производитель АО «Санитас». Ул. Вейверю 134 В, Каунас, LT - 46352, Литва	**Производитель(и)** – АО «Санитас». Ул. Вейверю 134 В, Каунас, LT - 46352, Литва – Эйч Би Эм Фарма с.р.о. Ул. Склабинска, 30, Мартин, 036 80, Словакия

Представитель
АО «Гриндекс» **Т.С. Заболотная**