# ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата

# КОГЕНЭЙТ ФС (KOGENATE FS)

Регистрационный номер: № П N015661/01

## Изменение № 2

Срок введения изменений с "19" 08 2010 г.

| Старая редакция | Новая редакция |
|---|---|
| **Форма выпуска**<br>Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения: по 250 МЕ, 500 МЕ, 1000 МЕ, 2000 МЕ препарата во флаконы прозрачного бесцветного стекла гидролитического типа I, укупоренные пробкой резиновой под обкатку колпачком алюминиевым, покрытым пластиковым защитным колпачком.<br>Растворитель: по 2,5 мл воды для инъекций для препарата в дозировках 250 МЕ, 500 МЕ и 1000 МЕ и по 5,0 мл воды для инъекций для препарата в дозировке 2000 МЕ в предварительно заполненном шприце из бесцветного прозрачного стекла гидролитического типа I с плунжером и верхней крышкой из эластомера. По 1 предварительно заполненному шприцу в блистер (ПВХ/бумага). | **Форма выпуска**<br>Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения: по 250 МЕ, 500 МЕ, 1000 МЕ, 2000 МЕ препарата во флаконы прозрачного бесцветного стекла гидролитического типа I, укупоренные пробкой резиновой под обкатку колпачком алюминиевым, покрытым пластиковым защитным колпачком.<br>Растворитель: по 2,5 мл воды для инъекций для препарата в дозировках 250 МЕ, 500 МЕ и 1000 МЕ и по 5,0 мл воды для инъекций для препарата в дозировке 2000 МЕ в предварительно заполненном шприце из бесцветного прозрачного стекла гидролитического типа I с плунжером и верхней крышкой из эластомера. |

| Старая редакция | Новая редакция |
|---|---|
| По 1 адаптеру для флакона в блистер (ПВХ/бумага). По 1 устройству для внутривенного введения в блистер (ПВХ/бумага). 1 флакон с препаратом, 1 блистер с предварительно заполненным шприцем с растворителем, 1 блистер с адаптером для флакона, 1 блистер с устройством для внутривенного введения вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку. | По 1 адаптеру для флакона в блистер (ПВХ/бумага). По 1 устройству для внутривенного введения в блистер (ПВХ/бумага). 1 флакон с препаратом, 1 предварительно заполненный шприц с растворителем, 1 блистер с адаптером для флакона, 1 блистер с устройством для внутривенного введения вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку. |

Представитель фирмы А.В. Солтицкая

«___»_____ 201__ г.