

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Ольхи соплодия
(Alni fructus)

Регистрационный номер

Торговое наименование. Ольхи соплодия.

Международное непатентованное или группировочное наименование. Ольхи соплодия.

Лекарственная форма. Соплодия порошок.

Состав. Ольхи соплодия.

Характеристика.

Соплодия ольхи содержат дубильные вещества и другие биологически активные вещества.

Описание.

Смесь кусочков плодоножек, чешуек, плодов-орешков и осей соплодий разнообразной формы. Цвет темно-коричневый с красновато- и желтовато-коричневыми вкраплениями. Запах слабый. Вкус водного извлечения вяжущий.

Фармакотерапевтическая группа.

Вяжущее средство растительного происхождения.

Фармакологическое действие.

Настой соплодий ольхи оказывает вяжущее действие.

Показания к применению.

Острые и хронические энтериты, колиты.

Противопоказания.

Повышенная чувствительность к препарату; беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 12 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания.

Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы.

2 фильтр-пакета (3,0 г) помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 100 мл (1/2 стакана) кипятка, накрывают и настаивают 30 минут, периодически надавливая на пакетики ложкой, затем их отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 100 мл.

Настой принимают внутрь по 2 столовые ложки 3 раза в день за 30 минут до еды. Курс лечения 2-3 недели.

Перед применением настоя рекомендуется взбалтывать.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие.

Возможны аллергические реакции. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка.

Случаи передозировки до настоящего времени не зарегистрированы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами.

Не описано.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами.

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска.

Соплодия порошок. По 1,5 г соплодий порошка в фильтр-пакете из бумаги термосвариваемой; по 20 фильтр-пакетов вкладывают в пачки из картона. Пачки с фильтр-пакетами заворачивают в пленку полимерную неокрашенную с целью контроля первого вскрытия.

Инструкция по применению вкладывается в пачку или текст инструкции по применению наносится на пачку.

Условия хранения.

В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С; приготовленный настой – в прохладном месте не более 2-х суток.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности.

4 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска.

Отпускают без рецепта.

Производитель / Держатель регистрационного удостоверения / Организация, принимающая претензии

АО «Красногорсклексредства»

Россия, 143444, Московская обл., г. Красногорск, ул. Мира (Опалиха мкр.), д. 25

Тел.: +7 (495) 705-93-80 • Факс: +7 (495) 705-93-82 • krls@krls.ru

Адрес производственной площадки (выпускающий контроль качества):

Россия, Московская обл., г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Мира, д. 25