

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО
ПРЕПАРАТА

Ондансетрон Прима

Ондансетрон

раствор для внутривенного и внутримышечного введения

АО «Фармасинтез», Россия

Изменение № 1

Дата внесения изменения « ____ » _____ 20 ____ г.

Старая редакция	Новая редакция
Описание От прозрачного бесцветного до желтого, коричневатого-желтого или зеленоватого-желтого оттенка раствор с легкой опалесценцией.	Описание Прозрачный бесцветный или слабо окрашенный раствор.
С осторожностью - у пациентов с гиперчувствительностью к другим антагонистам 5 НТ₃-рецепторов; - у пациентов с нарушениями сердечного ритма и проводимости; - у пациентов, получающих антиаритмические средства и бета-адреноблокаторы; - при одновременном применении с другими серотонинергическими лекарственными препаратами;	С осторожностью - у пациентов с гиперчувствительностью к другим антагонистам 5НТ₃-рецепторов; - у пациентов с нарушениями сердечного ритма и проводимости; - у пациентов, получающих антиаритмические средства и бета-адреноблокаторы; - при одновременном применении с другими серотонинергическими лекарственными препаратами;

- у пациентов со значительными нарушениями водно-электролитного баланса;
- у пациентов с удлинением или риском удлинения интервала QTc, включая пациентов с нарушениями водно-электролитного баланса, застойной сердечной недостаточностью, брадиаритмиями или у пациентов, принимающих другие лекарственные препараты, которые могут вызывать удлинение интервала QT или нарушения водно-электролитного баланса, или уменьшение частоты сердечных сокращений;
- у пациентов с ишемией миокарда;
- у пациентов с подострой кишечной непроходимостью.

- у пациентов со значительными нарушениями водно-электролитного баланса;
- у пациентов с удлинением или риском удлинения интервала QTc, включая пациентов с нарушениями водно-электролитного баланса, застойной сердечной недостаточностью, брадиаритмиями или у пациентов, принимающих другие лекарственные препараты, которые могут вызывать удлинение интервала QT или нарушения водно-электролитного баланса, или уменьшение частоты сердечных сокращений;
- у пациентов с ишемией миокарда;
- у пациентов с подострой кишечной непроходимостью.

Представитель
ООО «ИСТ-ФАРМ»



Малых Н.Ю.