

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Ортосифона тычиночного (почечного чая) листья
Orthosiphonis staminei folia

Регистрационный номер

Торговое наименование. Ортосифона тычиночного (почечного чая) листья.

Международное непатентованное или группировочное наименование. Ортосифона тычиночного листья.

Лекарственная форма. Листья порошок.

Состав. Листья и верхушки побегов ортосифона тычиночного (почечного чая).

Характеристика.

Листья ортосифона тычиночного содержат гликозид ортосифонин, сапонины, эфирное масло и другие биологически активные вещества.

Описание.

Кусочки листьев и стеблей различной формы. Цвет зеленый, серовато-зеленый с фиолетово-коричневыми, зеленовато-коричневыми и коричневыми вкраплениями. Запах характерный, слабый. Вкус водного извлечения слабо-горьковатый, слегка вяжущий.

Фармакотерапевтическая группа.

Диуретическое средство растительного происхождения.

Фармакологическое действие.

Настой листьев ортосифона тычиночного (почечного чая) оказывает умеренное диуретическое и спазмолитическое действие. Обладает также желчегонными свойствами, повышает секреторную активность слизистой оболочки желудка.

Диуретический эффект сопровождается выведением с мочой хлоридов, мочевины и мочевой кислоты.

Показания к применению.

В комплексной терапии при отеках, возникающих вследствие нарушения функции почек, хронической сердечной недостаточности.

Противопоказания.

Повышенная чувствительность к препарату, детский возраст до 12 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы.

1 фильтр-пакет (1,5 г) помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 100 мл (1/2 стакана) кипятка, накрывают и настаивают 15 минут, периодически надавливая на пакетик ложкой, затем его отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 100 мл.

Настой принимают внутрь в теплом виде по 1/2 стакана 2 раза в день за 20-30 минут до еды. Курс лечения 2-3 недели. Проведение повторного курса лечения возможно по согласованию с врачом.

Перед применением настоя рекомендуется взбалтывать.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие.

Возможны аллергические реакции. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка.

Случаи передозировки до настоящего времени не зарегистрированы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами.

Не описано.

Особые указания.

Настой листьев ортосифона тычиночного (почечного чая) следует готовить ежедневно.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами.

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска.

Листья порошок. По 1,5 г листьев порошка в фильтр-пакете из бумаги термосвариваемой; по 20 фильтр-пакетов вкладывают в пачки из картона. Пачки с фильтр-пакетами заворачивают в пленку полимерную неокрашенную с целью контроля первого вскрытия.

Инструкция по применению вкладывается в пачку или текст инструкции по применению наносится на пачку.

Условия хранения.

В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С; приготовленный настой – в прохладном месте не более суток.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности.

4 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска.

Отпускают без рецепта.

Производитель / Держатель регистрационного удостоверения / Организация, принимающая претензии

АО «Красногорсклексредства»

Россия, 143444, Московская обл., г. Красногорск, ул. Мира (Опалиха мкр.), д. 25

Тел.: +7 (495) 705-93-80 • Факс: +7 (495) 705-93-82 • krls@krls.ru

Адрес производственной площадки (выпускающий контроль качества):

Россия, Московская обл., г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Мира, д. 25