МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению лекарственного препарата

Пакликал®
наименование лекарственного препарата

Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 60 мг
лекарственная форма, дозировка

Оасмиа Фармасьютикал АБ, Швеция
наименование производителя, страна

Изменение № 3

Дата внесения Изменения «____» 280917 20___ г.

Старая редакция	**Новая редакция**
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНСТРУКЦИЯ по применению лекарственного препарата для медицинского применения **Пакликал®** **Регистрационный номер**	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНСТРУКЦИЯ по медицинскому применению лекарственного препарата **Пакликал®** **Регистрационный номер** ЛП-002952
Приготовление раствора для инфузий: Препарат Пакликал® растворяется в водных растворах с	*Приготовление раствора для инфузий:* Препарат Пакликал® растворяется в водных растворах с

образованием коллоидного нано-мицеллярного раствора. В качестве разбавляющего раствора следует использовать только Рингера растворы лактатный или ацетатный для инфузий. Величина pH раствора должна быть в пределах от 5,0 до 7,5, концентрация ионов кальция и магния должна быть в пределах, величины которых приведены в таблице 1: Таблица 1. Допустимые величины концентраций ионов кальция и магния в Рингера растворах лактатном или ацетатном для инфузий. Ион / Диапазон (ммоль/л) Ca^{2+} / 1.0 – 3.5* Mg^{2+} / 0 – 2* *Растворы, содержащие оба иона кальция и магния, должны иметь общую концентрацию кальция и магния в пределах от 1.8 до 3.5 ммоль/л.	образованием коллоидного нано-мицеллярного раствора. В качестве разбавляющего раствора следует использовать только Рингера растворы лактатный или ацетатный для инфузий. Величина pH раствора должна быть в пределах от 5,0 до 7,5, концентрация ионов кальция и магния должна быть в пределах, величины которых приведены в таблице 1: Таблица 1. Допустимые величины концентраций ионов кальция и магния в Рингера растворах лактатном или ацетатном для инфузий. Ион / Диапазон (ммоль/л) Ca^{2+} / 1,0 – 3,5* Mg^{2+} / 0 – 2* *Растворы, содержащие оба иона кальция и магния, должны иметь общую концентрацию кальция и магния в пределах от 1,8 до 3,5 ммоль/л.
Претензии предъявлять по адресу: Эксклюзивный дистрибьютор в Российской Федерации ОАО «ФАРМАСИНТЕЗ» Юридический адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Красногвардейская, д.23,	**Организация, принимающая претензии** Эксклюзивный дистрибьютор в Российской Федерации «Хетеро Лабс Лимитед» Адрес: 109029, Россия, Москва,

оф.3, тел. (3952)550355, факс (3952)550325 Почтовый адрес: 664040, г. Иркутск, а/я 17 Пакликал® является зарегистрированным товарным знаком компании Оасмиа Фармасьютикал АБ по свидетельству 488805 от 24 апреля 2012 г.	Автомобильный проезд д.6, стр. 5 Тел./Факс: (495) 2122700 Электронная почта: InfoRussia@heterodrugs.com Пакликал® является зарегистрированным товарным знаком компании Оасмиа Фармасьютикал АБ по свидетельству 488805 от 24 апреля 2012 г.

Генеральный директор
ЗАО «ЛегисФарм» О.В. Некрасов