ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
ПанзиКам

Регистрационный номер:
Торговое название: ПанзиКам
Международное непатентованное или группировочное название: Панкреатин
Лекарственная форма: таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой

Состав на одну таблетку, покрытую кишечнорастворимой оболочкой:
Активные компоненты:
Панкреатина энзимные активности:

протеолитическая	- 50 ЕД
амилолитическая	- 3100 ЕД
липолитическая	- 3000 ЕД

Вспомогательные вещества ядра: Лактоза (сахар молочный), повидон К-25, магния стеарат, целлюлоза микрокристаллическая.

Вспомогательные вещества оболочки: эудрагит L 100 (метакриловой кислоты и метилметакрилата сополимер), диэтилфталат, макрогол – 6000 (полиэтиленгликоль 6000), тальк, ванилин, титана диоксид (титана двуокись), тропеолин 0.

Описание. Круглые двояковыпуклые таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, жёлтого цвета. Вид на изломе: ядро от светло серого до светло серого с желтоватым оттенком цвета. Допускается специфический запах.

Фармакотерапевтическая группа
Пищеварительное ферментное средство.
Код АТХ: A09AA02

Фармакологическое действие
Входящие в состав препарата ферменты облегчают переваривание белков, жиров и углеводов, что способствует их более полному всасыванию в тонкой кишке, улучшают функциональное состояние ЖКТ, нормализуют процессы пищеварения. Максимальная ферментативная активность отмечается через 30-45 мин после приёма препарата.

Показания к применению
Заместительная терапия при внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы (при хронических воспалительно-дистрофических заболеваниях, состояниях после резекции или облучения); муковисцидоз; метеоризм, диарея неинфекционного генеза. Для улучшения переваривания пищи у лиц с нормальной функцией ЖКТ в случае погрешностей в питании (употребление жирной пищи, большого количества пищи, нерегулярное питание) и при нарушениях жевательной функции, малоподвижном образе жизни, длительной иммобилизации. Подготовка к рентгенологическому исследованию и УЗИ органов брюшной полости.

Противопоказания
Острый панкреатит, обострение хронического панкреатита, гиперчувствительность, непереносимость галактозы, дефицит лактазы или синдром глюкозо-галактозной мальабсорбции, детский возраст до 3-х лет.

Беременность и лактация:
Применение препарата при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) возможно только в том случае, если ожидаемый положительный эффект для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

20657

Способ применения и дозы
Внутрь, во время или после еды, проглатывая целиком, запивая большим количеством нещелочной жидкости (вода, фруктовые соки). Доза препарата (в пересчете на липазу) зависит от возраста и степени недостаточности поджелудочной железы. Средняя доза для взрослых – 15000 ЕД/сут; при полной недостаточности внешнесекреторной функции поджелудочной железы – 400000 ЕД/сут, что соответствует суточной потребности взрослого человека в липазе. Максимальная суточная доза – 15000-20000 ЕД/кг. У детей в возрасте старше 3 лет препарат применяется по назначению врача по 1-2 таблетки во время еды. Продолжительность лечения может варьировать от нескольких дней (при нарушении пищеварения, вследствие погрешностей в питании) до нескольких месяцев и даже лет (при необходимости постоянной заместительной терапии).

Побочное действие
Редко – диарея; при длительном применении в высоких дозах – гиперурикозурия, а у больных муковисцидозом – стриктуры в илеоцекальном отделе и в восходящей ободочной кишке. Возможны аллергические реакции.

Передозировка
Гиперурикозурия, гиперурикемия, у детей – запоры.
Лечение: отмена препарата, симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Снижает всасывание препаратов железа.

Форма выпуска
Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой. По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку. 1, 2, 3, 5 или 10 контурных упаковок вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

По 30 или 50 таблеток в банку полимерную или флакон полимерный, укупоренные крышкой навинчиваемой. Каждую банку или флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения
Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 ^{0}С.
Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности
2 года
Не применять препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек
Без рецепта.

Производитель/организация принимающая претензии:
ООО “Камелия НПП”
141055, Московская обл., г. Лобня, рп Луговая, Научный городок, корп.8
тел/факс 221-92-02.

Генеральный директор
ООО “Камелия НПП” В.В.Слуев

ООО "Камелия НПП"

РОСЗДРАВНАДЗОРА
ЭКСПЕРТНЫЙ ОТЧЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДЛЯ ДАННОЙ ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

20657