

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
ПАНТОКРИН

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Пантокрин

Международное непатентованное или группировочное наименование: Пантов
благородного оленя экстракт

Лекарственная форма: таблетки

Состав на одну таблетку

Активный компонент

Пантокрин (Пантов благородного оленя экстракт) экстракт для приема внутрь жидкий	— 1,0 мл
--	----------

Вспомогательные вещества

Лактозы моногидрат	— 0,113 г
Крахмал картофельный	— 0,028 г
Тальк	— 0,004 г
Кальция стеарат	— 0,001 г

Описание

Таблетки плоскоцилиндрической формы с фаской, белого с сероватым или с желтоватым оттенком цвета. Допускаются вкрапления сероватого и желтоватого цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Общетонизирующие средства.

Код АТХ

A13A.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Стимулирует центральную нервную и сердечно-сосудистую системы, повышает тонус скелетных мышц, двигательную активность кишечника. Содержит фосфолипиды

и микроэлементы, повышает работоспособность и нормализует артериальное давление при артериальной гипотензии, стимулирует деятельность органов желудочно-кишечного тракта.

Фармакокинетика

Не применимо.

Показания к применению

Переутомление, неврастения, неврозы, астенические состояния после острых инфекционных заболеваний, артериальная гипотензия (в составе комплексной терапии); в качестве тонизирующего и стимулирующего средства при повышенных физических и умственных нагрузках.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, артериальная гипертензия (повышенное артериальное давление), выраженный атеросклероз, хроническая сердечная недостаточность, органические заболевания сердца, стенокардия, повышенная возбудимость, нарушение сна, повышенная свертываемость крови, тяжелые заболевания печени, тяжелые формы нефрита, диарея, злокачественные новообразования, дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, беременность, период грудного вскармливания, возраст до 18 лет.

С осторожностью

Функциональные нарушения печени, сахарный диабет. Лицам, находящимся на диете с пониженным содержанием углеводов.

Если у Вас одно из перечисленных заболеваний, перед приемом препарата обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

Способ применения и дозы

Внутрь, в первой половине дня по 1-2 таблетки через 30 мин после еды 2-3 раза в день.

Курс лечения – 3-4 недели.

Повторные курсы лечения возможны по рекомендации врача.

Если в период лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции, редко (более 1/10000 и менее 1/1000) – тахикардия, нарушение сна, головная боль, повышение артериального давления.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, **сообщите об этом врачу.**

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки не зарегистрировано.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Не следует назначать с антикоагулянтами, солями кальция и лекарственными средствами, стимулирующими перистальтику кишечника.

Если Вы применяете вышеперечисленные или другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные), перед применением препарата Пантокрин проконсультируйтесь с врачом.

Особые указания

Во избежание нарушений сна не следует принимать препарат во второй половине дня. Пациентам с сахарным диабетом необходимо учитывать, что в одной таблетке содержится около 0,141 г углеводов (0,012 ХЕ).

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата не оказывает влияния на способность к управлению транспортными средствами и занятию другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Таблетки.

По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной.

3 или 5 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения/Производитель/Организация, принимающая претензии потребителей

ЗАО «ВИФИТЕХ», Россия

142279, Московская обл., г. Серпухов, п. Оболенск, ГНЦ ПМ.

Тел.: (495) 716-15-81, 716-15-90.