

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
ПАНТОКРИН

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Пантокрин

Международное непатентованное или группировочное наименование: Пантов
благородного оленя экстракт

Лекарственная форма: экстракт для приема внутрь жидкий

Состав

Для приготовления 1000 мл экстракта используются:

Панты марала и изюбра	— 100 г
Кислота уксусная	— 2,4 г
Спирт этиловый 50 % (этанол)	— достаточное количество до получения 1000 мл экстракта

Описание

Прозрачная или слегка опалесцирующая жидкость желтоватого или светло-желтого цвета с характерным запахом. Допускается выпадение осадка, растворяющегося при нагревании на водяной бане до температуры (45-50) °С. После охлаждения до комнатной температуры препарат остается прозрачным или слегка опалесцирующим.

Фармакотерапевтическая группа

Общетонизирующие средства.

Код АТХ

A13A.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Стимулирует центральную нервную и сердечно-сосудистую системы, повышает тонус скелетных мышц, двигательную активность кишечника. Содержит фосфолипиды и микроэлементы, повышает работоспособность и нормализует артериальное давление

при артериальной гипотензии, стимулирует деятельность органов желудочно-кишечного тракта.

Фармакокинетика

Не применимо.

Показания к применению

Переутомление, неврастения, неврозы, астенические состояния после острых инфекционных заболеваний, артериальная гипотензия (в составе комплексной терапии); в качестве тонизирующего и стимулирующего средства при повышенных физических и умственных нагрузках.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, артериальная гипертензия, выраженный атеросклероз, органические заболевания сердца, стенокардия, повышенная возбудимость, расстройства сна, повышенная свертываемость крови, тяжелые формы нефрита, диарея, злокачественные новообразования, беременность, период грудного вскармливания, возраст до 18 лет.

С осторожностью

Заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга.

Если у Вас одно из перечисленных заболеваний, перед приемом препарата обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

Способ применения и дозы

Внутрь, в первой половине дня по 25-40 капель за 30 минут до еды 2-3 раза в день.

Курс лечения – 3-4 недели.

Повторные курсы лечения возможны через 5-7 дней по рекомендации врача.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции по применению.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции, редко – более 1/10000 и менее 1/1000 – тахикардия, нарушение сна, головная боль, повышение артериального давления.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки не зарегистрировано.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Не следует назначать с антикоагулянтами, солями кальция и лекарственными средствами, стимулирующими перистальтику кишечника.

Если Вы применяете вышеперечисленные или другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные), перед применением препарата Пантокрин проконсультируйтесь с врачом.

Особые указания

Во избежание нарушений сна не следует принимать препарат во второй половине дня.

Содержание спирта в препарате составляет от 47,5 до 52,5 %.

В максимальной разовой дозе препарата содержание абсолютного этилового спирта (этанола) составляет около 0,83 г, в максимальной суточной дозе – около 2,49 г.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

В период лечения необходимо соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и занятиях другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Экстракт для приема внутрь жидкий.

По 50 или 100 мл во флаконы оранжевого стекла, укупоренные пробками и крышками навинчиваемыми. По 100 мл во флаконы оранжевого стекла, укупоренные колпачками алюминиевыми с перфорацией с прокладками полимерными. По 100 мл во флаконы из полиэтилентерефталата коричневого цвета с колпачками системы контроля первого вскрытия. Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре от 2 до 20 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

**Держатель регистрационного удостоверения/Производитель/Организация,
принимающая претензии потребителей**

ЗАО «ВИФИТЕХ», Россия

142279, Московская обл., г. Серпухов, п. Оболенск, ГНЦ ПМ.

Тел.: (495) 716-15-81, 716-15-90.