

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Пантокрин Пантея®

Группировочное наименование. Пантов благородного оленя экстракт&

Торговое наименование препарата. Пантокрин Пантея®

Лекарственная форма. Экстракт для приема внутрь жидкий

Для получения экстракта используют:

Активное вещество: панты оленя благородного (панты марала) - 120 г.

Вспомогательные вещества: уксусная кислота - 2,74 г, этанол (спирт этиловый) 50 % -
достаточное количество для получения 1000 мл препарата.

Описание

Прозрачная жидкость светло-желтого цвета.

При хранении допускается появление осадка, исчезающего при нагревании на водяной бане до температуры (45-50) °С. Раствор остается прозрачным после охлаждения до комнатной температуры.

Фармакотерапевтическая группа

Общетонизирующее средство природного происхождения.

Код АТХ: A13A

Фармакологическое действие

Стимулирует центральную нервную и сердечно-сосудистую системы, повышает тонус скелетных мышц, двигательную активность кишечника. Содержит фосфолипиды и микро-элементы, повышает работоспособность и нормализует артериальное давление при артериальной гипотензии, стимулирует деятельность органов желудочно-кишечного тракта.

Показания для применения

Переутомление, неврастения, астенические состояния после острых инфекционных заболеваний, артериальная гипотензия (в составе комплексной терапии); в качестве тонизирующего и стимулирующего средства при повышенных физических и умственных нагрузках.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, артериальная гипертензия, выраженный атеросклероз, стенокардия, органические заболевания сердца, повышенная возбудимость, расстройства сна, повышенная свертываемость крови, тяжелые формы нефрита, диарея, злокачественные новообразования. Препарат не рекомендуется применять в возрасте до 18 лет.

С осторожностью применять при заболеваниях печени, алкоголизме, черепно-мозговой травме, заболеваниях головного мозга.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Препарат противопоказан к применению при беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Внутрь: по 25-40 капель за 30 минут до еды 2-3 раза в день в течение 3-4 недель. Повторные курсы лечения возможны через 5-7 дней после консультации с врачом.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции, редко - тахикардия, нарушения сна, головная боль, повышение артериального давления.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не зарегистрированы.

Особые указания

Препарат не следует принимать во второй половине дня во избежание нарушений сна.

Лицам, имеющим хронические заболевания, перед применением препарата следует обязательно проконсультироваться с врачом.

Максимальная разовая доза препарата (40 капель/2 мл) содержит 0,8 г абсолютного этилового спирта.

Максимальная суточная доза препарата (120 капель/6 мл) содержит 2,4 г абсолютного этилового спирта.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Препарат не следует назначать с антикоагулянтами.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

В период лечения препаратом необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Экстракт для приема внутрь жидкий. По 30, 50 или 100 мл в бутылке из коричневого или оранжевого стекла, укупоренной крышкой навинчиваемой с уплотняющим элементом и контролем первого вскрытия или укупоренной пробкой-капельницей и крышкой навинчиваемой с контролем первого вскрытия.

Каждая бутылка вместе с инструкцией по применению помещена в пачку из картона.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускается без рецепта

Владелец регистрационного удостоверения / Предприятие-изготовитель / Организация, принимающая претензии от потребителей

ЗАО «Эвалар», Россия, 659332, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, тел. (3854) 39-00-50

**Председатель Совета
директоров ЗАО «Эвалар»**



Л.А.Прокопьева