

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ПАНТОКРИН

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Пантокрин

Международное непатентованное или группировочное наименование: пантов оленя благородного экстракт

Лекарственная форма: экстракт для приема внутрь жидкий

Состав

Для получения препарата необходимо:

панты оленя благородного – 100 г

этанол (спирт этиловый) 50 % – достаточное количество для получения 1000 мл препарата.

Описание: прозрачная жидкость светло-желтого цвета. В процессе хранения допускается образование осадка.

Фармакотерапевтическая группа: общетонизирующие средства

Код АТХ: A13A

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Механизм действия и фармакодинамические эффекты

Стимулирует центральную нервную и сердечно-сосудистую системы, повышает тонус скелетных мышц, двигательную активность кишечника. Содержит фосфолипиды и микроэлементы, повышает работоспособность и нормализует артериальное давление при артериальной гипотензии, стимулирует деятельность органов желудочно-кишечного тракта.

Фармакокинетика

Данные отсутствуют.

Показания к применению

Препарат Пантокрин показан к применению у взрослых от 18 лет.

Переутомление, неврастения, неврозы, астенические состояния после острых инфекционных заболеваний, артериальная гипотензия (в составе комплексной терапии); в качестве тонизирующего и стимулирующего средства при повышенных физических и умственных нагрузках.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, артериальная гипертензия, выраженный атеросклероз, органические заболевания сердца, стенокардия, повышенная возбудимость, расстройства сна, повышенная свертываемость крови, тяжелые формы нефрита, диарея, злокачественные новообразования, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 18 лет.

С осторожностью

Заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга, эпилепсия.

Если у Вас есть одно из перечисленных выше заболеваний/состояний или факторов риска, перед применением препарата необходимо проконсультироваться с врачом.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Препарат противопоказан при беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Внутрь, по 25-40 капель за 30 минут до еды 2-3 раза в день. Курс лечения – 3-4 недели.

Повторные курсы лечения возможны через 5-7 дней после консультации с врачом.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие

Нежелательные реакции (НР) сгруппированы по системно-органным классам в соответствии со словарем MedDRA.

Нарушения со стороны иммунной системы: аллергические реакции.

Нарушения со стороны нервной системы: нарушения сна, головная боль.

Нарушения со стороны сердца: тахикардия.

Нарушения со стороны сосудов: повышение артериального давления.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки не зарегистрировано.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Препарат не следует назначать с антикоагулянтами, солями кальция и лекарственными средствами, стимулирующими перистальтику кишечника.

Если вы применяете вышеперечисленные или другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные), перед применением препарата Пантокрин проконсультируйтесь с врачом.

Особые указания

Препарат не следует принимать во второй половине дня во избежание нарушений сна.

Содержание спирта в препарате от 48,0 до 52,0 %.

Данный лекарственный препарат содержит 830 мг спирта этилового в максимальной разовой дозе (40 капель), что эквивалентно 12 мг/кг на дозу. Количество данного лекарственного препарата эквивалентно менее чем 21 мл пива или 8 мл вина.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

В период лечения следует соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Экстракт для приема внутрь жидкий.

По 50 мл или 100 мл во флаконы из стекла марки ОС-1 с винтовой горловиной или во флаконы из стекла марки ОС с винтовой горловиной, укупоренные пробками из полиэтилена высокого давления и крышками навинчиваемыми из полиэтилена высокого давления или низкого давления, или из смеси полиэтилена высокого давления с полиэтиленом низкого давления, или крышками навинчиваемыми из полиэтилена низкого давления, или из смеси полиэтилена высокого давления с полиэтиленом низкого давления, или из полистирола ударопрочного, или из полипропилена, или колпачками алюминиевыми с накатываемой резьбой и контролем первого вскрытия с уплотнительным элементом или без уплотнительного элемента.

Каждый флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения/организация, принимающая претензии потребителей

АО «ДАЛЬХИМФАРМ», 680001, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ташкентская, д. 22, т/ф (4212) 53-91-86, info@dhph.ru.

Производитель

АО «ДАЛЬХИМФАРМ», 680001, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ташкентская, д. 22, стр. 3, 8, 9, т/ф (4212) 53-91-86, info@dhph.ru.