

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Кросацид

таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой 20 мг, 40 мг

Микро Лабс Лимитед, Индия

Изменение № 1

Дата внесения Изменения « » 15 03 17 20 г.

Старая редакция	Новая редакция
СОСТАВ Одна таблетка покрытая кишечнорастворимой оболочкой содержит: <i>действующее вещество</i> – пантопразол 20 мг (в виде в виде пантопразола натрия сесквигидрата 22,5 мг) или пантопразол 40 мг (в виде в виде пантопразола натрия сесквигидрата 45 мг); <i>вспомогательные вещества</i>: маннитол 60,75 мг / 121,50 мг, кроскармеллоза натрия 4 мг / 8 мг, кремния диоксид коллоидный 0,25 мг / 0,5 мг, натрия карбонат 7 мг / 14 мг, магния стеарат 1,5 мг / 3 мг; <i>состав оболочки</i>: гипромеллоза-15 тыс. 3,4 мг / 6,8 мг, макрогол-6000 1,371 мг / 2,742 мг; метакриловой кислоты и этилакрилата сополимер [1:1] 7,486 мг / 14,972 мг, тальк 1,506 мг / 3,012 мг, титана диоксид (E171) 0,509 мг / 1,019 мг,	СОСТАВ Одна таблетка покрытая кишечнорастворимой оболочкой содержит: <i>действующее вещество</i> – пантопразол 20 мг (в виде пантопразола натрия сесквигидрата 22,5 мг) или пантопразол 40 мг (в виде пантопразола натрия сесквигидрата 45 мг); <i>вспомогательные вещества</i>: маннитол 60,75 мг / 121,50 мг, кроскармеллоза натрия 4 мг / 8 мг, кремния диоксид коллоидный 0,25 мг / 0,5 мг, натрия карбонат 7 мг / 14 мг, магния стеарат 1,5 мг / 3 мг; <i>состав оболочки</i>: гипромеллоза-15 тыс. 3,4 мг / 6,8 мг, макрогол-6000 1,371 мг / 2,742 мг; метакриловой кислоты и этилакрилата сополимер [1:1] 7,486 мг / 14,972 мг, тальк 1,506 мг / 3,012 мг, титана диоксид (E171) 0,509 мг / 1,019 мг,

краситель железа оксид желтый (E172) 0,12 мг / 0,24 мг, натрия гидроксид 0,107 мг / 0,215 мг; <i>состав черных чернил:</i> шеллак глазурь 47,5 % в этаноле денатурированном (спирте метилированном 74 ОР), краситель железа оксид черный (E172), бутанол*, этанол денатурированный (спирт метилированный 74 ОР)*, лецитин соевый, пеногаситель (пищевого сорта). *-удаляются в процессе производства.	краситель железа оксид желтый (E172) 0,12 мг / 0,24 мг, натрия гидроксид 0,107 мг / 0,215 мг; <i>состав черных чернил:</i> шеллак глазурь 47,5 % в этаноле денатурированном (спирте метилированном 74 ОР), краситель железа оксид черный (E172), бутанол*, этанол денатурированный (спирт метилированный 74 ОР)*, лецитин соевый, пеногаситель (пищевого сорта). *-удаляются в процессе производства.
ОПИСАНИЕ <i>Дозировка 20 мг:</i> Двояковыпуклые таблетки овальной формы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, желтого цвета, с надписью «РТ20» черными чернилами на одной стороне. Вид таблетки на поперечном разрезе: оболочка – желтого цвета, ядро – светло-розового цвета. <i>Дозировка 40 мг:</i> Двояковыпуклые таблетки овальной формы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, желтого цвета, с надписью «РТ40» черными чернилами на одной стороне. Вид таблетки на поперечном разрезе: оболочка – желтого цвета, ядро – светло-розового цвета.	ОПИСАНИЕ <i>Дозировка 20 мг:</i> Двояковыпуклые таблетки овальной формы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, желтого цвета, с надписью «РТ20» черными чернилами на одной стороне. Вид таблетки на поперечном разрезе: оболочка – желтого цвета, ядро – от белого до светло-желтого цвета. <i>Дозировка 40 мг:</i> Двояковыпуклые таблетки овальной формы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, желтого цвета, с надписью «РТ40» черными чернилами на одной стороне. Вид таблетки на поперечном разрезе: оболочка – желтого цвета, ядро – от белого до светло-желтого цвета.

Представитель фирмы



Подколзина И.Н.