Инструкция
по медицинскому применению препарата
Папаверина гидрохлорид МС

Регистрационный номер:

Торговое название препарата: Папаверина гидрохлорид МС

МНН или группировочное название: папаверин

Лекарственная форма: таблетки.

Состав:
1 таблетка содержит:
активное вещество: папаверина гидрохлорид 40 мг;
вспомогательные вещества: сахароза – 236,5 мг, крахмал – 70 мг, кальция стеарат – 3,5 мг.

Описание:
Таблетки белого цвета с риской.

Фармакотерапевтическая группа: спазмолитическое средство.

Код АТХ: A03AD01

Фармакологическое действие
Спазмолитическое средство, оказывает гипотензивное действие. Ингибирует фосфодиэстеразу, вызывает накопление в клетке цикло-аденозинмонофосфата и снижение содержания Ca^{2+}; снижает тонус и расслабляет гладкие мышцы внутренних органов (желудочно-кишечного тракта, дыхательной и мочеполовой системы) и сосудов. В больших дозах снижает возбудимость сердечной мышцы и замедляет внутрисердечную проводимость. Действие на центральную нервную систему выражено слабо (в больших дозах оказывает седативный эффект).

Фармакокинетика
Абсорбция зависит от лекарственной формы. Биодоступность в среднем – 54 %. Связь с белками плазмы – 90 %. Хорошо распределяется, проникает через гистогематические барьеры. Метаболизируется в печени. Период полувыведения – 0,5-2 ч (может удлиняться до 24 ч). Выводится почками в виде метаболитов. Полностью удаляется из крови при гемодиализе.

Показания к применению
Папаверин применяют при спазмах гладких мышц:
- органов брюшной полости (холецистит, пилороспазм, спастический колит, почечная колика);
- периферических сосудов (эндартериит);
- сосудов головного мозга;
- сосудов сердца - стенокардия (в составе комплексной терапии);
- бронхоспазме.

В качестве вспомогательного лекарственного средства для премедикации.

Противопоказания
- гиперчувствительность;
- атриовентрикулярная блокада;
- глаукома;
- тяжелая печеночная недостаточность;
- пожилой возраст (риск развития гипертермии);
- детский возраст (до десяти лет).

47667

С осторожностью назначают пациентам после черепно-мозговой травмы, при хронической почечной недостаточности, недостаточности функции надпочечников, гипотиреозе, гиперплазии предстательной железы, наджелудочковой тахикардии, шоковых состояниях.
При беременности и лактации безопасность препарата не установлена.

Способ применения и дозы
Папаверин принимают внутрь по 40-60 мг 3-4 раза в сутки (взрослые). Высшая разовая доза - 200 мг, суточная - 600 мг.
Детям в возрасте 10-14 лет – 20 мг (½ таблетки).

Побочное действие
Со стороны кожных покровов: аллергические реакции.
Со стороны пищеварительного тракта: запор, повышение активности «печеночных» трансаминаз.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: атриовентрикулярная блокада, желудочковая экстрасистолия, снижение артериального давления.
Со стороны системы кроветворения: эозинофилия.
Со стороны центральной нервной системы: сонливость.

Передозировка
Симптомы передозировки: диплопия, слабость, снижение артериального давления, сонливость.
Лечение: симптоматическое (поддержание артериального давления).
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Возможно усиление гипотензивного эффекта папаверина при совместном применении с трициклическими антидепрессантами,
прокаинамидом,
резерпином,
хинидином.
Спазмолитическое действие папаверин усиливается при одновременном применении с барбитуратами
При одновременном применении папаверин снижает противопаркинсонический эффект леводопы и гипотензивный эффект метилдопы.

Особые указания
В период лечения прием этанола должен быть исключен.
Вазодилатирующее действие препарата снижается при табакокурении.

Форма выпуска
Таблетки по 40 мг в упаковке по 10 штук.
По 10 таблеток в контурной безъячейковой упаковке из бумаги с полимерным покрытием.
По 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной или бумаги с полимерным покрытием.
1, 2, 3, 5, 10 контурных безъячейковых или ячейковых упаковок с инструкцией по применению помещают в пачку.
Контурные упаковки вместе с равным количеством инструкций по применению помещают в групповую упаковку.

Условия хранения
Список Б.
В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С.
В недоступном для детей месте

47667

Срок годности
5 лет.
Не использовать препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек
Без рецепта врача.

Производитель

ЗАО «МЕДИСОРБ»
614113, г. Пермь, ул. Гальперина, 6
тел. (342) 258-61-28, 258-62-56; факс (342) 255-10-31
E-mail:medisorb@perm.ru. Internet: www.medisorb.ru

И.о. директора ИДКЭЛС А.Н. Васильев

РОСЗДРАВНАДЗОРА
ЭКСПЕРТНЫЙ ОТЧЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДЛЯ ДАННОЙ ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Директор по науке ЗАО «Медисорб», профессор Г.П. Вдовина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕДИСОРБ РОССИЯ г. ПЕРМЬ

476673