

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
Карипазим

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Карипазим

Международное непатентованное или группировочное наименование: Папаин млечный сок

Лекарственная форма. Лиофилизат для приготовления раствора для наружного применения.

Состав

1 флакон содержит: Папаин млечный сок (Папаин) - 350 ПЕ

Описание

Лиофилизат (сухая пористая масса, в виде таблетки, цельная или раскрошенная) белого или белого со слегка желтоватым оттенком цвета.

Фармакотерапевтическая группа: другие средства для лечения заболеваний костно-мышечной системы.

Код АТХ: M09AX.

Фармакологические свойства

Протеолитическое средство для наружного применения. Ферментный препарат, по механизму действия является подобным химотрипсину и трипсину.

При наружном применении методом электрофореза препарат влияет на коллагеновые хрящевые ткани, усиливает регенерацию тканей межпозвонкового диска.

При клиническом применении препарата методом электрофореза в течении 14 дней на фоне стандартной терапии показана достоверная положительная динамика ряда диагностических показателей дорсопатии, тенденция к снижению невропатологических симптомов и улучшение качества жизни.

Фармакокинетика

При наружном применении препарат не всасывается и не оказывает системного влияния на организм.

Показания к применению

В качестве вспомогательного средства в комплексной терапии дорсопатий различных отделов позвоночника.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к препарату. Беременность, период грудного вскармливания.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

Способ применения и дозы

Наружно. Приготовленный раствор применяется методом электрофореза.

Раствор готовят непосредственно перед применением.

Содержимое флакона разводят в 10 мл 0,5 % растворе прокаина или 0,9 % растворе натрия хлорида. К полученному раствору добавляют 0,02-0,06 мг (2-3 капли) Димексида (диметилсульфоксида). Фильтровальную бумагу равномерно смачивают готовым раствором, помещают на прокладку положительного электрода аппарата для электрофореза, и помещают на области патологии.

На прокладку отрицательного электрода наносят воду, 3-5 мл 2,4 % раствора аминофиллина или калия йодида.

Температура прокладок должна быть от 37 °С до 39 °С.

Возможные варианты расположения прокладок (определяет врач-физиотерапевт):

(+) электрод на область шеи, (-) электрод на область поясницы, продольно
(+) электрод на область шеи, (-) электрод раздвоенный на оба плеча, продольно
(+) электрод на поясницу, (-) электрод раздвоенный на оба бедра, продольно в точках выхода седалищного нерва
(+) электрод на область поясницы, (-) электрод на область живота, поперечно

Процедуру электрофореза проводят при силе тока от 5 до 15 мА, начиная с 5 мА; время экспозиции от 10 до 20 мин с постепенным увеличением.

Курс лечения не менее 14 процедур. Повторные курсы проводят после консультации с врачом через 30-45 дней.

Побочное действие

Аллергические реакции.

Передозировка

Симптомы

При передозировке возможно усиление побочных эффектов.

Лечение

В этих случаях проводят десенсибилизирующую терапию.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Клинически значимых взаимодействий с другими лекарственными средствами не установлено.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата не оказывает влияние на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

Форма выпуска

Лиофилизат для приготовления раствора для наружного применения, 350 ПЕ.

По 350 ПЕ во флаконы стеклянные вместимостью 10 мл из светлого и темного стекла первого, второго и третьего гидролитического класса импортные, укупоренные пробками резиновыми и обжаты колпачками алюминиевыми.

На флаконы наклеивают этикетки из бумаги этикеточной или писчей.

По 1 или 10 флаконов вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

В оригинальной упаковке (флакон в пачке) при температуре не выше 15 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают по рецепту.

Владелец регистрационного удостоверения

ООО «МедФлорина», Россия

142279, Московская обл., г. Серпухов, р.п. Оболенск, тер. Квартал Б, д. 33.

Тел. +7(4967)31-21-74, +7(985)405-24-25

Производитель

ООО «МедФлорина», Россия

Московская обл., г.о. Серпухов, р.п. Оболенск, тер. Квартал Б, д. 33.

Организация, принимающая претензии от потребителей

ООО «МедФлорина», Россия

142279, Московская обл., г. Серпухов, р.п. Оболенск, тер. Квартал Б, д. 33.

Тел. +7(4967)31-21-74, +7(985)405-24-25