ИНСТРУКЦИЯ
(информация для потребителей)
по медицинскому применению препарата
ДЕТСКИЙ ПАНАДОЛ
PANADOL BABY

Регистрационный номер:

Торговое патентованное название: ДЕТСКИЙ ПАНАДОЛ

Международное непатентованное название: парацетамол

Лекарственная форма: суппозитории ректальные

Состав:
Каждый суппозиторий содержит парацетамола 250 мг.
Вспомогательные вещества: твердые жиры.

Описание: Белые или почти белые однородные жирные на вид суппозитории конусообразной формы, не имеющие физических дефектов и видимых вкраплений и неоднородностей.

Фармакотерапевтическая группа: анальгезирующее ненаркотическое средство.
Код АТХ: N02BE01.

Фармакологические свойства:
Препарат обладает жаропонижающим, болеутоляющим и слабым противовоспалительным действием.

Показания к применению:
Детский Панадол суппозитории по 250 мг применяется у детей от 3 до 6 лет (с массой тела от 13 до 20 кг) в качестве жаропонижающего средства при простудных заболеваниях, гриппе и детских инфекционных заболеваниях, таких как ветряная оспа, краснуха, коклюш, корь, скарлатина и эпидемический паротит (свинка). Препарат рекомендован для снижения повышенной температуры тела у детей после вакцинации.
Препарат используют как обезболивающее средство при болях, связанных с прорезыванием зубов, зубной боли, ушной боли при отите и боли в горле.
Детский Панадол суппозитории показаны детям, с трудом принимающим таблетки или склонным к рвотной реакции.

Противопоказания:
- повышенная чувствительность к парацетамолу или любому другому ингредиенту препарата;
- тяжелые нарушения функции печени или почек;
- недавнее воспаление или кровотечение в прямой кишке (противопоказание, связанное с путем введения).

С осторожностью:
Применять с осторожностью при нарушеной функции печени (в т.ч. синдроме Жильбера), почек, генетическом отсутствии фермента глюкозо-6-фосфат дегидрогеназы, тяжелых заболеваниях крови (тяжелая анемия, лейкопения, тромбоцитопения). В таких случаях перед приемом препарата следует проконсультироваться с врачом.
Препарат не следует принимать одновременно с другими парацетамол-содержащими препаратами.

Способ применения и дозы:
Препарат применяют ректально. Вымойте руки и освободите суппозиторий из пластиковой оболочки. Аккуратно введите суппозиторий указательным пальцем в задний проход ребенка (предпочтительно после очистительной клизмы или самопроизвольного опорожнения кишечника).
Средняя разовая доза Детского Панадола в суппозиториях зависит от массы тела ребенка и составляет 10-15 мг/кг массы тела 3-4 раза в сутки через каждые 4-6 часов. Максимальная суточная доза не должна превышать 60 мг/кг массы тела.
Детям с массой тела от 13 до 20 кг (обычно от 3 до 6 лет) вводят по 1 свече (250 мг) 3-4 раза в сутки через 4-6 часов. Не следует применять более 4 свечей в сутки.

Продолжительность лечения:
3 дня в качестве жаропонижающего и до 5 дней в качестве болеутоляющего средства.

Не превышайте рекомендованную дозу. При отсутствии терапевтического эффекта прекратите лечение и обратитесь к лечащему врачу.

Побочные действия:
В рекомендованных дозах парацетамол редко оказывает побочное действие. Иногда возможны тошнота, рвота, аллергические реакции (кожная сыпь, зуд, крапивница, отек Квинке). Редко – анемия, тромбоцитопения, лейкопения.
При длительном применении с превышением рекомендованной дозы может наблюдаться гепатотоксическое и нефротоксическое действие.
При появлении побочных реакций прекратите прием препарата и обратитесь к врачу.

Передозировка:
Признаками острого отравления парацетамолом являются тошнота, рвота, боли в желудке, потливость, бледность кожных покровов. Через 1-2 суток определяются признаки поражения печени. В тяжелых случаях развивается печеночная недостаточность, энцефалопатия и коматозное состояние. При появлении симптомов отравления прекратите применение препарата и немедленно обратитесь к врачу. Специфическим антидотом при отравлении парацетамолом является ацетилцистеин.
При случайной передозировке следует немедленно обратиться за медицинской помощью, даже если ребенок чувствует себя хорошо.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:
При использовании Детского Панадола вместе с барбитуратами, противосудорожными средствами, рифампицином повышается риск гепатотоксического действия.
При одновременном приеме с левомицетином (хлорамфениколом) токсичность последнего возрастает.
Парацетамол, содержащийся в Детском Панадоле, при длительном регулярном приеме усиливает действие антикоагулянтов непрямого действия, что может увеличивать риск кровотечения.
Индукторы микросомального окисления в печени (фенитоин, барбитураты, рифампицин, фенилбутозон, трициклические антидепрессанты) и гепатотоксические лекарственные средства увеличивают продукцию гидроксилированных активных метаболитов, что обуславливает возможность развития тяжелых интоксикаций даже при небольшой передозировке.
Ингибиторы микросомального окисления (в том числе циметидин) снижают риск гепатотоксического действия.
Дифлунисал повышает концентрацию парацетамола в плазме на 50 % - риск развития гепатотоксичности.
Миелотоксические лекарственные средства усиливают проявления гепатотоксичности препарата.
При проведении анализов на определение мочевой кислоты и уровня сахара в крови сообщите врачу о применении Детского Панадола.

Особые указания:
При применении препарата более недели необходим контроль за функциональным состоянием печени и картиной периферической крови.

Форма выпуска:
Суппозитории ректальные 250 мг. 5 или 10 суппозиториев в стрипы из поливинилхлорида и полиэтилена. 1 или 2 стрипа помещают в картонную пачку вместе с инструкцией по применению.

Условия хранения:
Хранить при температуре не выше 25°С.
Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:
5 лет. Не используйте после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек:
Без рецепта

Производитель: «ГлаксоСмитКляйн Санте Гран Публик, произведено Глаксо Вэллком Продакшн», Франция.
Glaxo Wellcome Production, 440 Avenue du General de Gaulle,
14200 Herouville Saint Claire, France
Глаксо Вэллком Продакшн, 440 Авеню дюГенераль де Голль, 14200. Эрувилль Сен Клер, Франция.

Адрес в России: 119180 г.Москва, Якиманская наб., д.2
ЗАО «ГлаксоСмитКляйн Хелскер»
Тел. 777 9850
Факс 777 9851/52

И.о. директора ИДЭЛС А.Н.Васильев

Представитель фирмы Высоцкая В.В.