ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

Панадол

таблетки растворимые 500 мг

Регистрационный номер: П N014375/01

Изменение № 3

Срок введения изменений с "23" 04 2010 г.

Старая редакция	Новая редакция
Способ применения и дозы Внутрь. Панадол, таблетки растворимые, перед приемом следует растворить не менее чем в 100 мл (полстакана) воды. *Дети.* Дозу для детей рассчитывают, исходя из массы тела ребенка: максимальная разовая доза - 15 мг/кг массы тела, максимальная суточная доза – 60 мг/кг массы тела. Детям 6-9 лет следует давать ½ таблетки 3-4 раза в сутки, если необходимо. Интервал между приемами – не менее 4 часов. Максимальная разовая доза для детей 6-9 лет - ½ таблетки (250 мг), максимальная суточная – 2 таблетки (1 г).	Способ применения и дозы Внутрь. Панадол, таблетки растворимые, перед приемом следует растворить не менее чем в 100 мл (полстакана) воды. *Дети.* Дозу для детей рассчитывают, исходя из массы тела ребенка: максимальная разовая доза - 15 мг/кг массы тела, максимальная суточная доза – 60 мг/кг массы тела. Детям 6-9 лет следует давать ½ таблетки 3-4 раза в сутки, если необходимо. Интервал между приемами – не менее 4 часов. Максимальная разовая доза для детей 6-9 лет - ½ таблетки (250 мг), максимальная суточная – 2 таблетки (1 г).

Старая редакция	Новая редакция
Детям 9-12 лет следует давать 1 таблетку 3-4 раза в сутки, если необходимо. Интервал между приемами – не менее 4 часов. Максимальная разовая доза для детей 9-12 лет 1 таблетка (0,5 г), максимальная суточная – 4 таблетки (2 г). *Взрослые.* Обычно по 1-2 таблетки 3-4 раза в сутки, если необходимо. Интервал между приемами – не менее 4 часов. Максимальная разовая доза для взрослых 2 таблетки (1 г), максимальная суточная – 8 таблеток (4 г). Препарат не рекомендуется применять более пяти дней в качестве обезболивающего и более трех дней в качестве жаропонижающего средства без назначения и наблюдения врача. Увеличение суточной дозы препарата или продолжительности лечения возможно только под наблюдением врача.	Детям 9-12 лет следует давать 1 таблетку 3-4 раза в сутки, если необходимо. Интервал между приемами – не менее 4 часов. Максимальная разовая доза для детей 9-12 лет 1 таблетка (0,5 г), максимальная суточная – 4 таблетки (2 г). *Взрослые.* Обычно по 1-2 таблетки 3-4 раза в сутки, если необходимо. Интервал между приемами – не менее 4 часов. Максимальная разовая доза для взрослых 2 таблетки (1 г), максимальная суточная – 8 таблеток (4 г). Препарат не рекомендуется применять более пяти дней в качестве обезболивающего и более трех дней жаропонижающего средства без назначения и наблюдения врача. Увеличение суточной дозы препарата или продолжительности лечения возможно только под наблюдением врача.

Менеджер по регистрации
ЗАО «ГлаксоСмитКляйн Хелскер» Блажнова И.И.