МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

МИНЗДРАВ РОССИИ
П N014375/01- 050214
СОГЛАСОВАНО

Панадол®

таблетки растворимые

Фамар С.А., Греция

Изменение № 5

Дата внесения Изменения «____» 050214 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Применение при беременности и в период грудного вскармливания Во время беременности и в период грудного вскармливания применять только в рекомендованных дозах после консультации с врачом. Парацетамол проникает в грудное молоко в незначительном количестве.	**Применение при беременности и в период грудного вскармливания** По данным эпидемиологических исследований среди беременных парацетамол не оказывает неблагоприятных эффектов при применении в рекомендованных дозах во время беременности. Тем не менее, применение во время беременности возможно только после консультации с врачом. Парацетамол проникает в грудное молоко в незначительном количестве. Согласно опубликованным данным применение во время грудного вскармливания не противопоказано.

Старая редакция	Новая редакция
Способ применения и дозы: Внутрь. «Панадол®», таблетки растворимые, перед приемом следует растворить не менее чем в 100 мл (полстакана) воды. *Взрослые (включая пожилых):* 1-2 таблетки (0,5 – 1 г) до 4 раз в сутки, если необходимо. Максимальная разовая доза – 2 таблетки (1 г). Максимальная суточная доза – 8 таблеток (4 г). Интервал между приемами – не менее 4 часов. *Дети* Дозу рассчитывают, исходя из массы тела ребенка: максимальная разовая доза – 15 мг/кг массы тела, максимальная суточная доза – 60 мг/кг массы тела. *Дети (6-9 лет):* ½ таблетки (250 мг) до 4 раз в сутки, если необходимо. Максимальная разовая доза - ½ таблетки (250 мг). Максимальная суточная – 2 таблетки (1 г). Интервал между приемами – не менее 4 часов. *Дети (9-12 лет):* 1 таблетка (500 мг) до 4 раз в сутки, если необходимо. Максимальная разовая доза – 1	**Способ применения и дозы:** Внутрь. «Панадол®», таблетки растворимые, перед приемом следует растворить не менее чем в 100 мл (полстакана) воды. *Взрослые (включая пожилых):* 1-2 таблетки (0,5 – 1 г) до 4 раз в сутки, по мере необходимости. Максимальная разовая доза – 2 таблетки (1 г). Максимальная суточная доза – 8 таблеток (4 г). Интервал между приемами – не менее 4 часов. *Дети* Дозу рассчитывают, исходя из массы тела ребенка: максимальная разовая доза – 15 мг/кг массы тела, максимальная суточная доза – 60 мг/кг массы тела. *Дети (6-9 лет):* ½ таблетки (250 мг) до 4 раз в сутки, по мере необходимости. Максимальная разовая доза - ½ таблетки (250 мг). Максимальная суточная – 2 таблетки (1 г). Интервал между приемами – не менее 4 часов. *Дети (9-12 лет):* 1 таблетка (500 мг) до 4 раз в сутки, по мере

Старая редакция	Новая редакция
таблетка (500 мг). Максимальная суточная доза – 4 таблетки (2 г). Интервал между приемами – не менее 4 часов. У взрослых препарат не рекомендуется применять более 5 дней в качестве обезболивающего средства и более 3 дней в качестве жаропонижающего средства без назначения и наблюдения врача. У детей препарат не рекомендуется применять более 3 дней без назначения и наблюдения врача. Не превышать указанную дозу. В случае превышения рекомендованной дозы немедленно обратитесь к врачу, даже если Вы чувствуете себя хорошо, так как существует риск отсроченного серьезного повреждения печени. Увеличение суточной дозы препарата или продолжительности лечения возможны только под наблюдением врача.	необходимости. Максимальная разовая доза – 1 таблетка (500 мг). Максимальная суточная доза – 4 таблетки (2 г). Интервал между приемами – не менее 4 часов. У взрослых препарат не рекомендуется применять более 5 дней в качестве обезболивающего средства и более 3 дней в качестве жаропонижающего средства без назначения и наблюдения врача. У детей препарат не рекомендуется применять более 3 дней без назначения и наблюдения врача. Не превышать указанную дозу. В случае превышения рекомендованной дозы немедленно обратитесь к врачу, даже если Вы чувствуете себя хорошо, так как существует риск отсроченного серьезного повреждения печени. Увеличение суточной дозы препарата или продолжительности лечения возможны только под наблюдением врача.

Менеджер по регистрации
ЗАО «ГлаксоСмитКляйн Хелскер» Артеменко И.Н.