ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА
Грипэнд® ХотАктив Макс

Регистрационный номер:
Торговое название препарата: Грипэнд® ХотАктив Макс
Международное непатентованное или группировочное название:
Парацетамол+Фенилэфрин+Аскорбиновая кислота
Лекарственная форма: порошок для приготовления раствора для приема внутрь
Состав: 1 пакетик содержит:
действующие вещества:

Парацетамол	1000,0 мг
Аскорбиновая кислота	100,0 мг
Фенилэфрина гидрохлорид	12,2 мг

вспомогательные вещества:
сахароза, натрия цитрат, лимонная кислота, ацесульфам калия, аспартам, краситель хинолиновый желтый, ароматизатор лимонный Ф/29088, ароматизатор лимонный Ф/29089, ароматизатор лимонный Ф/28151, ароматизатор лимонный 501.476/АП0504
Описание: порошок белого с желтоватым оттенком цвета с характерным запахом лимона.
Фармакологическая группа: ОРЗ и "простуды" симптомов средство устранения (анальгезирующее ненаркотическое средство+альфа-адреномиметик+витамин)
Код АТХ: N02BE51
Фармакологические свойства:
Грипэнд® ХотАктив Макс с лимонным вкусом является комбинированным лекарственным средством, действие которого обусловлено входящими в его состав компонентами, оказывает жаропонижающее, анальгезирующее, сосудосуживающее действие, устраняет симптомы "простуды". Парацетамол оказывает обезболивающее и жаропонижающее действие. За счет угнетения циклооксигеназы арахидоновой кислоты предотвращает образование простагландинов в центральной нервной системе (ЦНС).
Фенилэфрин уменьшает отек слизистых оболочек пазух носа, вследствие чего облегчается дыхание. Аскорбиновая кислота восполняет повышенную потребность в витамине С при простуде и гриппе.

Показания к применению
Грипэнд® ХотАктив Макс применяется для устранения симптомов простудных заболеваний и гриппа, таких как повышенная температура, головная боль, озноб, боль в суставах и мышцах, ощущение заложенности носа, боли в пазухах носа и в горле.

Противопоказания
Гиперчувствительность; выраженная почечная или печеночная недостаточность; гипертиреоз; заболевания сердечно-сосудистой системы (выраженный аортальный стеноз, острый инфаркт миокарда, тахиаритмия); артериальная гипертензия; гиперплазия предстательной железы; закрытоугольная глаукома; одновременный прием трициклических антидепрессантов, бета-адреноблокаторов, ингибиторов моноаминооксидазы (МАО) (в т.ч. в течение 14 дней после их отмены), других парацетамолсодержащих препаратов; сахарный диабет и наследственные нарушения всасывания глюкозы; детский возраст (до 18 лет); заболевания системы крови.
С осторожностью при доброкачественных гипербилирубинемиях, дефиците глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы.

Беременность и период лактации

Препарат может применяться в период беременности, если потенциальная польза для матери превышает возможный риск для плода. Не следует применять в период кормления грудью.

Способ применения и дозы

Внутрь, по 1 пакетику каждые 4-6 часов (не более 4 пакетиков в сутки). Содержимое пакетика растворяют в 250 мл горячей воды до полного растворения.

Препарат не рекомендуется применять более пяти дней без консультации с врачом. Если симптомы сохраняются, обратитесь к врачу.

Не превышайте указанную дозу. В случае передозировки, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Побочное действие:

В рекомендованных дозах препарат обычно хорошо переносится.

Парацетамол редко оказывает побочное действие. Иногда возможны аллергические реакции, например, кожная сыпь, крапивница, ангионевротический отек. Редко – тромбоцитопения, лейкопения, агранулоцитоз. При длительном применении с превышением рекомендованной дозы может наблюдаться гепатотоксическое и нефротоксической действие.

Фенилэфрин может вызывать тошноту, головную боль, незначительное повышение артериального давления и в редких случаях сердцебиение, которые проходят после отмены препарата.

В случае появления любых нежелательных реакций обратитесь к врачу.

Передозировка

Симптомы: тошнота, рвота, анорексия, боли в желудке, потливость, бледность кожных покровов, сердечные аритмии, повышение активности "печеночных" трансаминаз, увеличение протромбинового времени, гепатонекроз и коматозное состояние.

Лечение: промывание желудка в течение первых 4-х часов отравления, прием активированного угля; симптоматическая терапия. Специфический антидот - ацетилцистеин.

При передозировке следует немедленно обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Стимуляторы микросомального окисления в печени (фенитоин, этанол, барбитураты, рифампицин, фенилбутазон, трициклические антидепрессанты) увеличивают продукцию гидроксилированных активных метаболитов парацетамола, что обусловливает возможность развития тяжелых интоксикаций при небольших передозировках.

Парацетамол усиливает эффекты ингибиторов МАО, седативных препаратов, этанола.

При одновременном приеме с антидепрессантами, противопаркинсоническими, антипсихотическими лекарственными средствами, производными фенотиазина – увеличивается риск задержки мочи, сухости во рту, запора.

Фенилэфрин снижает гипотензивный эффект гуанетидина.

Гуанетидин усиливает альфа-адреностимулирующий эффект, а трициклические антидепрессанты - симпатомиметический эффекты фенилэфрина.

Глюкокортикостероиды увеличивают риск развития глаукомы. Парацетамол снижает эффективность диуретических препаратов.

Метоклопрамид, домперидон повышают скорость всасывания парацетамола, а колестирамин снижает.

Витамин С повышает всасывание пенициллина, железа, уменьшает действие гепарина и непрямых антикоагулянтов, увеличивает риск кристаллоурии при лечении салицилатами. Всасывание витамина С уменьшается при одновременном применении с оральными контрацептивами.

Витамин С замедляет выведение почками кислот, уменьшает реабсорбцию препаратов, имеющих щелочную реакцию (в т.ч. алкалоидов).

Витамин С в комбинации с дефероксамином увеличивает токсическое действие железа на ткани (особенно на сердце, вызывая развитие сердечной недостаточности), назначение препаратов, содержащих аскорбиновую кислоту проводится после определения концентрации

дефероксамина и определения экскреции железа, не ранее чем через 1-2 часа после инфузии дефероксамина.

Особые указания

Искажает результаты лабораторных тестов, оценивающих концентрацию глюкозы и мочевой кислоты в плазме.

Не следует одновременно применять с другими лекарственными средствами, содержащими парацетамол, а также с ненаркотическими анальгетиками, нестероидными противовоспалительными препаратами (метамизол, ацетилсалициловая кислота, ибупрофен и т.п.), барбитуратами, противоэпилептическими препаратами, рифампицином, хлорамфениколом.

Одно саше содержит 1,936 г сахарозы, что соответствует 0,2 хлебным единицам.

Форма выпуска

Порошок для приготовления раствора для приема внутрь.

По 5 г порошка в саше из бум/полиэтилен/Ал/полиэтилен.

По 5 или 8 саше в картонной пачке с инструкцией по применению.

Условия хранения

При температуре не выше 25°С, в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года

Не следует применять препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель/организация принимающая претензии

Рафтон Лабораториз Лимитед - Великобритания

Контроль качества: ООО «ЮС Фармация» - Польша

ул. Зембицка 40, 50-507 Вроцлав, Польша

тел. +48 (71) 336 88 00, факс: +48 (71) 336 51 23

Для получения более подробной информации следует обратиться к представителю ответственного предприятия:

Польша, 02-801 Варшава, ул. Пулавска, 435А, Польша

тел. +48 (22) 543 60 00, факс: +48 (22) 543 87 97

Представительство в Москве: Москва, ул. Ольховская 45 стр. 1

И.о. директора ИДКЭКЛ Васильев А.Н.

Представитель фирмы Олефир В.В.

US PHARMACIA

US PHARMACIA Sp. z o.o.

ul. Ziębicka 40, 50-507 Wrocław

NIP [illegible] Regon [illegible]