МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА

ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

ЛСР-000834/08

Сиректилл, капли для приема внутрь 10 мг/мл

Италфармако С.п.А., Италия

Изменение № 1

Срок введения Изменений с «18» 05 2010 г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав: 1 мл раствора содержит: ***Активное вещество:*** пароксетина гидрохлорид – 11,11 мг (эквивалент свободному основанию пароксетина - 10 мг). ***Вспомогательные вещества:*** бетадекс (бетациклодекстрин), сахароза, ароматизатор анисовый (этиловый спирт, вода, природный анетол), натрия бензоат, вода очищенная – до 1 мл. **Форма выпуска** Капли для приёма внутрь 10 мг/мл во флаконе темного стекла типа III с алюминиевым наворачивающимся колпачком, покрытым	**Состав:** 1 мл раствора содержит: ***Активное вещество:*** пароксетина гидрохлорид - 11,11 мг *(эквивалент свободному основанию пароксетина - 10,00 мг)* ***Вспомогательные вещества:*** гидроксипропилбетадекс (гидроксипропил-бетациклодекстрин), сахароза, ароматизатор анисовый (этиловый спирт, вода, природный анетол), натрия бензоат, вода очищенная. **Форма выпуска** Капли для приёма внутрь 10 мг/мл во флаконе темного стекла типа III с алюминиевым наворачивающимся колпачком, покрытым

Старая редакция	Новая редакция
изнутри полиэтиленом. Каждый флакон 30 мл, в комплекте с дозирующей крышкой-пипеткой, наворачивающейся после удаления алюминиевого колпачка, и инструкцией по применению в картонной пачке. Дозирующая пипетка из прозрачного стекла типа III тарирована для извлечения 0,5 мл, 1 мл, 1,5 мл, 2 мл раствора, соответствующего 10, 20, 30, 40 каплям, соответственно.	изнутри полиэтиленом. Каждый флакон 30 мл или 60 мл в комплекте с дозирующей крышкой-пипеткой, наворачивающейся после удаления алюминиевого колпачка, и инструкцией по применению в картонной пачке. Дозирующая пипетка из прозрачного стекла типа III тарирована для извлечения 0,5 мл, 1 мл, 1,5 мл, 2 мл раствора, соответствующего 10, 20, 30, 40 каплям, соответственно.
Условия хранения: Хранить при температуре не выше 25 ^{0}C, в защищенном от света месте. Хранить 15 суток после первого вскрытия флакона. Хранить в недоступном для детей месте.	**Условия хранения:** Хранить при температуре не выше 25 ^{0}C, в защищенном от света месте. Хранить 30 суток после первого вскрытия флакона. Хранить в недоступном для детей месте.

Глава Представительства
АО «Италфармако» Л.И.Никова

«____»_____2010 г