МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛС-001926- 070513
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Фенистил® Пенцивир (Fenistil® Pencivir)
наименование лекарственного препарата
крем для наружного применения дозированный, 1 %
лекарственная форма, дозировка
Новартис Фарма Продукционс ГмбХ, Германия
название фирмы-производителя, страна

Изменение № 1

Дата внесения Изменения «____» 070513 20___ г.

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ	НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
Лекарственная форма: крем для наружного применения.	**Лекарственная форма**: крем для наружного применения, крем для наружного применения (с тонирующим эффектом).
Состав: 1 г крема содержит: *Активное вещество* - 10 мг пенцикловира. *Вспомогательные вещества:* цетомакрогол 1000 9,40 мг, цетостеариловый спирт 77,20 мг, парафин мягкий белый 148,50 мг, парафин жидкий 59,40 мг, пропиленгликоль 415,55 мг, вода очищенная 277,45 мг,	**Состав:** 1 г крема содержит: *Активное вещество* - 10 мг пенцикловира. Крем для наружного применения: *Вспомогательные вещества:* цетомакрогол 1000 9,40 мг, цетостеариловый спирт 77,20 мг, парафин мягкий белый 148,50 мг, парафин жидкий 59,40 мг, пропиленгликоль 416,80 мг, вода очищенная 278,70 мг. Крем для наружного применения (с тонирующим эффектом): *Вспомогательные вещества:* цетомакрогол 1000 9,40 мг, цетостеариловый спирт 77,20 мг, парафин мягкий белый 148,50 мг, парафин жидкий 59,40 мг, пропиленгликоль 415,55 мг, вода очищенная

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ	НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
	277,45 мг, краситель железа оксид красный 1,70 мг, краситель железа оксид желтый 0,80 мг.
Описание: однородный крем белого цвета.	**Описание:** Крем для наружного применения: однородный крем белого цвета. Крем для наружного применения (с тонирующим эффектом): однородный крем от бежевого до коричневого цвета.
Способ применения и дозы Наружно. Взрослые и дети с 12 лет. Небольшой объем крема выдавливают на кончик пальца и наносят на пораженный участок каждые 2 часа (примерно 8 раз в день). Крем также можно наносить при помощи ватного тампона или одноразового аппликатора (для упаковок, содержащих аппликаторы). Курс терапии проводят в течение 4 дней.	**Способ применения и дозы** Наружно. Взрослые и дети с 12 лет. Небольшой объем крема выдавливают на кончик пальца и наносят на пораженный участок каждые 2 часа (примерно 8 раз в день). Крем также можно наносить при помощи ватного тампона или одноразового аппликатора (для упаковок, содержащих аппликаторы). Курс терапии проводят в течение 4 дней. Крем для наружного применения (с тонирующим эффектом): крем с тонирующим эффектом обладает маскирующим свойствами, маскирует пораженные герпесом участки на губах и на коже вокруг рта.
Форма выпуска Крем для наружного применения 1 %. По 2 г или 5 г препарата в алюминиевую тубу с навинчивающейся крышкой. Тубу вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку или в пластиковый пенал с зеркалом, двумя полиэтиленовыми пакетиками, содержащими по 10 одноразовых пластиковых	**Форма выпуска** Крем для наружного применения 1 %. По 2 г или 5 г препарата в алюминиевую тубу с навинчивающейся крышкой. Тубу вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку. Для Фенистил® Пенцивир, крем для наружного применения 1 % дополнительно: По 2 г или 5 г препарата в

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ	НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
аппликаторов, и инструкцией по применению. Пенал имеет этикетку с контролем первого вскрытия.	алюминиевую тубу с навинчивающейся крышкой. Тубу вместе с инструкцией по применению помещают в пластиковый пенал с зеркалом, двумя полиэтиленовыми пакетиками, содержащими по 10 одноразовых пластиковых аппликаторов, и инструкцией по применению. Пенал имеет этикетку с контролем первого вскрытия.

Специалист по регистрации
ООО «Новартис Консьюмер Хелс» Травина Е.В.