ЛП-№(002331)-(РГ-RU) от 28.01.2026

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 10.05.2023 № 8685
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Гербифорс

Регистрационный номер:

Торговое наименование

Гербифорс

Международное непатентованное или группировочное наименование

Первоцвета весеннего корней экстракт + Тимьяна обыкновенного травы экстракт

Лекарственная форма

Сироп

Состав на 1 мл

Активные компоненты:

Первоцвета весеннего корней экстракт	
(Первоцвета весеннего корней экстракт жидкий (1:2-4,6))	- 0,206 г
Тимьяна обыкновенного травы экстракт	
(Тимьяна обыкновенного травы экстракт жидкий (1:3,3))	- 0,412 г
Вспомогательные вещества:	
Левоментол	- 0,012 мг
Метилпарагидроксибензоат	- 1,75 мг
Сахароза	- 0,632 г

Описание

Сироп коричневого цвета с характерным запахом. Допускается наличие опалесценции.

Фармакотерапевтическая группа

Препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях; отхаркивающие средства, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами; отхаркивающие средства.

Код АТХ: R05CA10

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 10.05.2023 № 8685
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Фармакологические свойства

Препарат обладает отхаркивающим, противовоспалительным, противомикробным действием; способствует уменьшению вязкости мокроты и лучшему ее отхождению.

Показания к применению

Препарат применяется у взрослых и детей в возрасте от 2-х лет в качестве отхаркивающего средства в комплексной терапии воспалительных заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся кашлем с трудно отделяемой мокротой (в том числе бронхит, трахеит, трахеобронхит).

Противопоказания

Гиперчувствительность к активным компонентам препарата, а также к препаратам, содержащим активные вещества семейства первоцветные и семейства яснотковые или к любому из вспомогательных веществ; дети после перенесенного острого обструктивного ларингита (круп); бронхиальная астма, сахарный диабет; дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы; глюкозо-галактозная мальабсорбция; детский возраст до 2-х лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано (в связи с недостаточностью данных по безопасности препарата у данной группы пациентов).

Способ применения и дозы

Внутрь, препарат рекомендуется принимать, запивая достаточным количеством теплой воды. Перед применением взбалтывать. 1 мерная ложка – 5 мл.

Взрослым рекомендуется принимать по 3 мерные ложки (15 мл) 3-4 раза в сутки после еды. Детям в возрасте от 2 до 5 лет - по 1/2 мерной ложки (2,5 мл) 3 раза в сутки после еды. Детям в возрасте от 5 до 14 лет - по 1 мерной ложке (5 мл) сиропа 3 раза в сутки после еды. Детям старше 14 лет - по 2 мерные ложки (10 мл) сиропа 3-4 раза в сутки.

Длительность курса терапии – 2-3 недели. Увеличение длительности или проведение повторного курса лечения возможно после консультации с врачом.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции. Возможны в очень редких случаях: тошнота, рвота, диарея. В случае появления побочных эффектов следует прекратить прием препарата и

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 10.05.2023 № 8685
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

обратиться к врачу.

Передозировка

Сообщений о случаях передозировки препарата не поступало.

В случае передозировки сапонинсодержащих препаратов, возможны желудочно-кишечные расстройства, проявляющиеся тошнотой, рвотой, диареей.

Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Препарат не следует применять одновременно с противокашлевыми препаратами и лекарственными средствами, уменьшающими образование мокроты, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

Особые указания

В 1 мерной ложке сиропа (5 мл) содержится 3,15 г сахарозы. При соблюдении рекомендаций по применению препарата, указанных в инструкции, пациент получает на прием от 3,15 г (1 мерная ложка — 5 мл, что соответствует 0,315 хлебным единицам) до 9,45 г (3 мерные ложки — 15 мл, что соответствует 0,945 хлебным единицам) сахарозы.

При сохранении симптомов заболевания или ухудшения состояния на фоне применения препарата в течение 7 дней, следует обратиться к врачу.

Влияние лекарственного препарата на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата не влияет на способность к управлению транспортными средствами и занятию другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Сироп.

По 100 мл, 150 мл препарата во флаконы темного стекла укупоренные пробками полиэтиленовыми и навинчиваемыми пластмассовыми крышками или укупоренные средствами укупорочными полиэтиленовыми, или полимерными, или укупоренные колпачками алюминиевыми.

По 100 мл, 150 мл препарата во флаконы полимерные из полиэтилена, укупоренные пробками полиэтиленовыми и навинчиваемыми пластмассовыми крышками или

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 10.05.2023 № 8685
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

укупоренные средствами укупорочными полиэтиленовыми, или полимерными, или укупоренные колпачками алюминиевыми.

По 100 мл, 150 мл препарата во флаконы из полиэтилентерефталата укупоренные колпачками полимерными винтовыми.

На каждый флакон наклеивают этикетку из бумаги или самоклеящуюся этикетку.

Каждый флакон вместе с пластиковой ложкой или пластиковым мерным стаканчиком или колпачком вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

Допускается упаковка флаконов без пачки от 9 до 300 штук с равным количеством инструкций по медицинскому применению в ящик из гофрированного картона (для стационаров).

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель/Организация, принимающая претензии:

ООО «Тульская фармацевтическая фабрика»

Россия, 300004, г. Тула, Торховский проезд, д. 10

Тел./факс: +7 (4872) 41-04-73

Директор

ООО «Тульская фармацевтическая фабрика» Л.Я. Рабинович