# ИНСТРУКЦИЯ
## по медицинскому применению препарата
## МЕДИФОКС® (MEDIFOX)

**Регистрационный номер:**

**Торговое название** МЕДИФОКС®

**Международное непатентованное название** Перметрин.

**Химическое название** (3-Феноксифенил)метиловый эфир 3-(2,2-дихлорэтенил)-2,2-диметилциклопропанкарбоновой кислоты.

**Лекарственная форма** Концентрат для приготовления эмульсии для наружного применения.

**Состав** в 100 г

Активное вещество: перметрин (в пересчете на 100% вещество) 5,0 г.

Вспомогательные вещества: масло касторовое медицинское 7,5 г, бутилацетат 0,25 г, этанол 96% 87,25 г.

**Описание** Прозрачная жидкость бесцветная или светло-желтого цвета.

**Фармакотерапевтическая группа** Средство уничтожения эктопаразитов.

**Код АТХ:** P03AC04.

**Фармакологическое действие** Противопаразитарное средство. Нарушает проницаемость для катионов мембран нервных клеток насекомых. Эффективно в отношении чесоточных клещей, а также гнид, личинок и половозрелых особей головных и лобковых вшей. Малотоксично для теплокровных животных и человека, при нанесении на кожу в рекомендованных дозах и концентрациях не обладает кожно-резорбтивным, местно-раздражающим и сенсибилизирующим действием.

**Показания к применению** Чесотка, головной и лобковый педикулез.

**Противопоказания** Индивидуальная непереносимость, детский возраст до 1 года.

**С осторожностью** Беременность, период лактации. На период лечения чесотки необходимо отказаться от грудного вскармливания.

**Способ применения и дозы** Чесотка. Флакон, содержащий 24 мл препарата (для удобства применения на флакон нанесены метки), или 12 ампул по 2 мл, рассчитаны на трехдневный курс лечения. Применяют наружно в виде свежеприготовленной 0,4 % водной эмульсии, для чего 1/3 содержимого флакона (8 мл) или 4 ампулы по 2 мл добавляют к 100 мл теплой кипяченой воды. Готовую эмульсию 1 раз в день (на ночь) тщательно втирают в кожные покровы верхних конечностей, туловища, а затем нижних конечностей. Не подлежат обработке кожа лица и шеи, а также волосистая часть головы. По окончании курса лечения на четвертый день больной должен принять душ и провести смену нательного и постельного белья.

При лечении головного и лобкового педикулеза применяют наружно в виде свежеприготовленной 0,2% водной эмульсии. Для получения эмульсии 1/3 содержимого флакона (8 мл) добавляют к 200 мл теплой кипяченой воды. При использовании концентрата в ампулах для получения эмульсии к 50 мл воды добавляют содержимое 1 ампулы (2 мл); при длинных, густых волосах и высокой численности насекомых к 100 мл воды добавляют 4 мл препарата. Полученную водную эмульсию обильно наносят на влажные волосы головы или волосистые части тела (при лобковом педикулезе), слегка втирая в кожу с помощью ватного тампона. Через 20 минут после обработки средство смывают теплой проточной водой с мылом (шампунем).

**Побочное действие** В отдельных случаях может возникнуть ощущение жжения в местах нанесения препарата, которое проходит самостоятельно через несколько минут. Аллергические реакции.

**Особые указания** Избегать попадания препарата на слизистую оболочку глаз, носовых ходов и ротовой полости, а также на слизистую оболочку наружных половых органов. В случае попадания препарата на слизистые оболочки их следует промыть проточной водой. При лечении педикулеза во избежание попадания препарата в глаза детей с 1 года одеть на голову

Буданов.

**защитный козырек или на лицо накинуть косынку, при этом после обработки следует вымыть руки.**

**Форма выпуска** Концентрат для приготовления эмульсии для наружного применения 5% по 2 мл в ампулах из нейтрального стекла или полимерные, по 2 ампулы вместе с ножом для вскрытия уложены в контурную ячейковую упаковку из полимера и помещенную в коробку из картона коробочного вместе с инструкцией по применению; концентрат для приготовления эмульсии для наружного применения 5% во флаконах-капельницах из темного стекла или флаконах полимерных, укупоренных пробкой-капельницей и завинчивающихся пластмассовой резьбовой крышкой, по 24 мл, помещенных в коробку из картона вместе с инструкцией по применению.

**Условия хранения:** Хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте, при температуре не выше +25°С.

**Срок годности** 5 лет. Не использовать по окончании срока годности, указанного на упаковке.

**Условия отпуска из аптек** Без рецепта.

**Производитель** ООО Научно-производственный центр «ФОКС и Ко», 117638, Москва, Симферопольский бульвар, 8, тел/факс: 317-20-37.

**Претензии по качеству препарата направлять в адрес производителя** 117638, Москва, Симферопольский бульвар, 8.

Директор ИДКЭЛС С.В. Буданов

Директор ООО НПЦ «ФОКС и Ко» В. В. Оханов