



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ПЕРЦА СТРУЧКОВОГО НАСТОЙКА

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Перца стручкового настойка

Международное непатентованное или группировочное наименование:

Перца стручкового плодов настойка

Лекарственная форма: Настойка

Состав.

Для приготовления 1 л настойки используют:

Перца стручкового плодов — 100 г

Спирта этилового 90 % (этанолa) — достаточное количество до получения 1 л настойки

Описание

Прозрачная жидкость красновато-желтого цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Местнораздражающее средство растительного происхождения.

Код АТХ: M02AB

Фармакологическое действие

Фармакологические свойства перца стручкового настойки обусловлены содержанием алкалоида капсаицина. Препарат обладает местным раздражающим, отвлекающим и разогревающим действием, вызывая усиление местного кровотока в коже, воздействуя на болезненные процессы, локализованные также и в глубине тканей.

Показания к применению

Применяют наружно в качестве местнораздражающего и отвлекающего средства при невралгиях, радикулитах, миозитах, люмбаго, люмбоишалгии.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

Дерматологические заболевания в месте нанесения настойки; нарушение целостности кожных покровов, детский возраст до 12 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение при беременности и в период грудного вскармливания возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы

Препарат применяют наружно. Небольшое количество настойки втирают в соответствующий участок кожи 1-2 раза в сутки. При достижении положительного эффекта применение препарата заканчивают.

Побочное действие

Аллергические реакции, сильное жжение в месте нанесения препарата.

Если любые из указанных побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не зарегистрированы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не описано.

Особые указания

Не допускать попадания препарата в глаза. Препарат не следует наносить на слизистые оболочки, открытые раны и поврежденные или воспаленные участки кожи. После применения настойки необходимо вымыть руки теплой водой с мылом. При попадании препарата в рот или нос следует тщательно промыть их водой.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

Форма выпуска

Настойка.

По 25 мл во флаконы или флаконы-капельницы оранжевого стекла, укупоренные пробкой и крышкой навинчиваемой, или пробкой-капельницей и крышкой навинчиваемой, или крышкой навинчиваемой с уплотняющим элементом, или колпачком алюминиевым, или кнопочным распылителем.

По 25 мл во флаконы или флаконы-капельницы полимерные, укупоренные пробкой и крышкой навинчиваемой, или укупоренные пробкой-капельницей и крышкой навинчиваемой, или крышкой навинчиваемой, или крышкой укупорочно-навинчиваемой, или колпачком, или кнопочным распылителем.

На флаконы, флаконы-капельницы наклеивают этикетки из бумаги этикеточной или писчей, или самоклеящиеся этикетки, или контрэтикетки.

Каждый флакон, флакон-капельницу вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона коробочного марки А или типа хром-эрзац.

Допускается нанесение полного текста инструкции по медицинскому применению на пачку из картона.

Флаконы, флаконы-капельницы с равным количеством инструкций по медицинскому применению помещают в пленку полиэтиленовую термоусадочную или в ящик из гофрированного картона, или в коробку из картона (для стационаров).

На термоусадочную пленку, ящик, коробку наклеивают этикетки из бумаги этикеточной или писчей, или самоклеящиеся этикетки, или контрэтикетки.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре от 8 до 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

4 года.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.


Условия отпуска

Без рецепта.

Производитель/организация, принимающая претензии:

ООО «БЭГРИФ»,
633010, Россия, Новосибирская обл., г. Бердск,
ул. Химзаводская, 11/19
Тел./факс (383) 212-59-73, (383-41) 2-97-53.

Директор ООО «БЭГРИФ»



С.И. Тимофеев