

## ИНСТРУКЦИЯ

## ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

## ПИОНА ЭКСТРАКТ

**Регистрационный номер:****Торговое наименование:** Пиона экстракт**Международное непатентованное или группировочное наименование:**

Пиона уклоняющегося [корневищ и корней + травы] экстракт

**Лекарственная форма:** таблетки, покрытые оболочкой**Состав на одну таблетку***Активного компонента*

Пиона экстракта сухого  
с содержанием суммы фенольных гликозидов  
в пересчете на салицин и сухое вещество 16,0 %

– 0,150 г

*Вспомогательных веществ ядра*

[сахар молочный (лактоза), крахмал  
картофельный, поливинилпирролидон  
низкомолекулярный медицинский (повидон),  
кальция стеарат, магния карбонат основной  
(магния гидроксикарбонат)]

– достаточное количество  
до получения таблетки без  
оболочки массой 0,300 г

*Вспомогательных веществ оболочки*

[сахар (сахароза), магния карбонат основной  
(магния гидроксикарбонат), поливинилпирроли-  
дон низкомолекулярный медицинский  
(повидон), титана двуокись пигментная (титана  
диоксид), аэросил (кремния диоксид  
коллоидный), воск пчелиный, вазелиновое  
масло (парафин жидкий)]

– достаточное количество  
до получения таблетки,  
покрытой оболочкой,  
методом наращивания,  
массой 0,510 г

**Описание**

Таблетки круглые двояковыпуклой формы, покрытые оболочкой, от белого до белого с желтоватым оттенком цвета.

**Фармакотерапевтическая группа**

Психолептики; снотворные и седативные средства; другие снотворные и седативные средства.

**Код АТХ:** N05CM

### **Фармакологические свойства**

Оказывает выраженное седативное действие. При доклиническом экспериментальном изучении выявлены анксиолитические, противосудорожные, мембраностабилизирующие, антиоксидантные, стресспротективные и антигипоксические свойства.

### **Показания к применению**

Нарушение сна, повышенная нервная возбудимость, нейроциркуляторная дистония.

### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст (до 12 лет), непереносимость лактозы и фруктозы, дефицит лактазы и сахаразы/изомальтазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция (препарат содержит лактозу и сахарозу).

**С осторожностью:** печеночная и/или почечная недостаточность.

### **Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

Применение препарата противопоказано при беременности и в период грудного вскармливания.

### **Способ применения и дозы**

Внутрь, по 1 таблетке 2 раза в день за 30 минут до еды. Курс лечения 21-30 дней. При необходимости курс лечения повторяют после 10-дневного перерыва, после консультации с врачом.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо обратиться к врачу. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

### **Побочное действие**

Возможны аллергические реакции.

### **Передозировка**

При передозировке возможно угнетение центральной нервной системы, сонливость.

Лечение: симптоматическое.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Препараты пиона уклоняющегося способствуют ослаблению эффекта средств, тонизирующих центральную нервную систему; усиливают действие снотворных, седативных средств и спазмолитиков.

Если Вы применяете вышеперечисленные или другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные), перед применением препарата Пиона экстракт проконсультируйтесь с врачом.

### **Особые указания**

Пациентам с сахарным диабетом необходимо учитывать, что в 1 таблетке препарата содержится около 0,275 г углеводов (0,023 ХЕ).

### **Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами**

В период применения препарата необходимо соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора). При длительном применении в больших дозах возможно снижение скорости психомоторных реакций; при появлении подобного состояния следует воздержаться от выполнения указанных потенциально опасных видов деятельности.

### **Форма выпуска**

Таблетки, покрытые оболочкой, 150 мг. По 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке. 2 или 3 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению в пачке из картона.

### **Условия хранения**

В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

### **Срок годности**

2 года.

Не применять по истечении срока годности.

### **Условия отпуска**

Отпускают без рецепта.

**Производитель**

ЗАО «ВИФИТЕХ», Россия

Московская обл., Серпуховский муниципальный район, городское поселение Оболенск,  
район рабочего поселка Оболенск, шоссе Оболенское, стр. 20.

**Владелец регистрационного удостоверения/Организация, принимающая претензии  
потребителей**

ЗАО «ВИФИТЕХ», Россия

142279, Московская обл., Серпуховский район, рабочий пос. Оболенск, ГНЦ ПМ.

Тел./факс: (495) 716-15-81, 716-15-90.