

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ПИОНА УКЛОНЯЮЩЕГОСЯ НАСТОЙКА

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Пиона уклоняющегося настойка

Международное непатентованное или группировочное наименование: Пиона уклоняющегося трава + Пиона уклоняющегося корневища и корни

Лекарственная форма: настойка

Состав

Для приготовления 1000 мл настойки необходимо:

Пиона уклоняющегося травы	— 50 г
Пиона уклоняющегося корневищ и корней	— 50 г
Спирта этилового 40 % (этанол)	— достаточное количество для получения 1000 мл настойки

Описание

Прозрачная жидкость от светло-коричневого до коричневого цвета с характерным запахом. При хранении допускается выпадение осадка.

Фармакотерапевтическая группа

Психолептики; снотворные и седативные средства; другие снотворные и седативные средства.

Код АТХ

N05CM.

Фармакологические свойства

Оказывает седативное действие на центральную нервную систему.

Показания к применению

Нарушение сна, повышенная нервная возбудимость, нейро-циркуляторная дистония.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, печеночная и/или почечная недостаточность, детский возраст (до 12 лет).

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Не рекомендуется применять при беременности и в период грудного вскармливания в связи с отсутствием специальных исследований.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами

В период применения препарата следует воздержаться от выполнения потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора)

Способ применения и дозы

Внутрь, взрослым и детям старше 12 лет, по 30-40 капель 3 раза в день. Длительность приема 25-30 дней. Проведение повторного курса лечения возможно после 10-дневного перерыва после консультации с врачом.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции.

Передозировка

При передозировке возможно усиление побочных эффектов.

Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Препарат способствует ослаблению эффекта средств, тонизирующих центральную нервную систему; усиливает действие снотворных, седативных средств и спазмолитиков.

Особые указания

Содержание этилового спирта в продукте – 40 %.

Максимальная разовая доза препарата содержит 0,4 г абсолютного этилового спирта, максимальная суточная доза – 1,2 г абсолютного этилового спирта.

Форма выпуска

Настойка.

По 25 мл во флаконы оранжевого стекла, укупоренные пробками полиэтиленовыми и крышками пластмассовыми навинчиваемыми.

Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона для потребительской тары.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре от 12 до 15 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения/Производитель/Организация, принимающая претензии потребителей

Российская Федерация

ЗАО «ВИФИТЕХ»

142279, Московская обл., г. Серпухов, п. Оболенск, ГНЦ ПМ

Телефон: +7 (495) 716-15-81, 716-15-90

Адрес электронной почты: vifiteh@mail.ru