

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Пиона уклоняющегося настойка

Регистрационный номер:

Торговое наименование

Пиона уклоняющегося настойка

Международное непатентованное или группировочное наименование

Пиона уклоняющегося травы, корневищ и корней настойка

Лекарственная форма

Настойка

Состав:

Для приготовления 1000 мл настойки необходимо:

Активные вещества: пиона уклоняющегося корневища и корни – 50 г, пиона уклоняющегося трава – 50 г.

Вспомогательное вещество: этанол (этиловый спирт) 40 % – достаточное количество до получения 1000 мл препарата.

Описание

Прозрачная жидкость светло-коричневого цвета, с запахом метилсалицилата. В процессе хранения настойки возможно выпадение осадка.

Фармакотерапевтическая группа

Психолептики; снотворные и седативные средства; другие снотворные и седативные средства.

Код АТХ: N05CM

Фармакологическое действие

Оказывает седативное действие на центральную нервную систему.

Показания к применению

Применяют в качестве седативного средства при нарушениях сна, повышенной нервной возбудимости, вегето-сосудистых нарушениях.

Противопоказания

Гиперчувствительность к пиона уклоняющегося траве, корневищам и корням или к любому из вспомогательных веществ, печеночная и/или почечная недостаточность, детский возраст до 12 лет, беременность, период грудного вскармливания.

С осторожностью

Заболевания печени, заболевания почек, алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга, эпилепсия, детский возраст старше 12 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

Способ применения и дозы

Внутрь взрослым и детям старше 12 лет по 30-40 капель на прием 3 раза в день в течение 25-30 дней. Курс лечения может быть повторен после 10-дневного перерыва после консультации с врачом.

Если после лечения улучшения не наступает, или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки при применении препарата не зарегистрировано.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Способствует ослаблению эффекта средств, тонизирующих центральную нервную систему; усиливает действие снотворных, седативных средств, спазмолитиков.

Если Вы применяете вышеперечисленные или другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные) перед применением препарата Пиона уклоняющегося настойка проконсультируйтесь с врачом.

Особые указания

Максимальная разовая доза препарата содержит 0,4 г абсолютного этилового спирта, максимальная суточная доза – 1,2 г абсолютного этилового спирта.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

В период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Настойка.

По 10, 15, 20, 25 мл препарата во флаконы-капельницы оранжевого стекла с винтовой горловиной, укупоренные пробками полиэтиленовыми или пробками-капельницами полиэтиленовыми и навинчиваемыми пластмассовыми крышками.

По 10, 15, 20, 25 мл препарата во флаконы темного стекла, укупоренные пробками полиэтиленовыми или пробками-капельницами и навинчиваемыми пластмассовыми крышками или средствами укупорочными полиэтиленовыми или полимерными, или капельницами и крышками пластиковыми.

По 10, 15, 20, 25 мл препарата во флаконы полимерные или флаконы-капельницы, укупоренные пробками полиэтиленовыми, или пробками-капельницами и навинчиваемыми пластмассовыми крышками, или укупоренные средствами укупорочными полиэтиленовыми или полимерными, или укупоренные капельницами и крышками пластиковыми.

По 10, 15, 20, 25 мл препарата во флаконы из полиэтилентерефталата, укупоренные колпачками полимерными винтовыми.

По 5, 10, 15, 20, 25 мл препарата во флаконы-капельницы полимерные.

Каждый флакон, флакон-капельницу вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

По 9, 18 кг в канистры полиэтиленовые с крышкой (для стационаров).

По 9, 18 кг в бутылки стеклянные, укупоренные пробками притертыми или крышками навинчиваемыми, с прокладками (для стационаров).

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре от 2 до 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения

ООО «Тульская фармацевтическая фабрика»

Россия, 300004, г. Тула, Торховский проезд, д. 10

Производитель/Организация, принимающая претензии от потребителей:

ООО «Тульская фармацевтическая фабрика»

Россия, 300004, г. Тула, Торховский проезд, д. 10

Тел./факс: (4872) 41-04-73.