МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

МИНЗДРАВ РОССИИ
№ ЛП-009976-211021
СОГЛАСОВАНО

ТАЗОЦИН®

Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 2 г + 0,25 г, 4 г + 0,5 г.

Вайет Ледерле С.р.л., Италия

Изменение № 5

Дата внесения Изменения «____» 211021 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав на один флакон 2 г + 0,25 г *Активные вещества:* пиперациллин натрия 2084,9 мг (в пересчете на пиперациллина моногидрат 2000,0 мг), тазобактам натрия 268,3 мг (в пересчете на тазобактам 250,0 мг); *вспомогательные вещества:* натрия цитрата дигидрат 110,22 мг (в пересчете на	**Состав на один флакон 2 г + 0,25 г** *Действующие вещества:* пиперациллин натрия 2084,9 мг (в пересчете на пиперациллина моногидрат 2000,0 мг), тазобактам натрия 268,3 мг (в пересчете на тазобактам 250,0 мг); *вспомогательные вещества:* натрия цитрата дигидрат 110,22 мг (в

лимонную кислоту 72,0 мг), динатрия эдетата дигидрат 0,5 мг. **Состав на один флакон 4 г + 0,5 г** *Активные вещества:* пиперациллин натрия 4169,9 мг (в пересчете на пиперациллина моногидрат 4000,0 мг), тазобактам натрия 536,6 мг (в пересчете на тазобактам 500,0 мг); *вспомогательные вещества:* натрия цитрата дигидрат 220,43 мг (в пересчете на лимонную кислоту 144,0 мг), динатрия эдетата дигидрат 1,0 мг.	пересчете на лимонную кислоту 72,0 мг), динатрия эдетата дигидрат 0,5 мг. **Состав на один флакон 4 г + 0,5 г** *Действующие вещества:* пиперациллин натрия 4169,9 мг (в пересчете на пиперациллина моногидрат 4000,0 мг), тазобактам натрия 536,6 мг (в пересчете на тазобактам 500,0 мг); *вспомогательные вещества:* натрия цитрата дигидрат 220,43 мг (в пересчете на лимонную кислоту 144,0 мг), динатрия эдетата дигидрат 1,0 мг.
Форма выпуска **Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 2 г + 0,25 г, 4 г + 0,5 г.** Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 2 г + 0,25 г: по 2 г пиперациллина моногидрата и 0,25 г тазобактама во флаконы бесцветного стекла (тип I) вместимостью 30 мл, укупоренные бутилкаучуковой пробкой и закатанные алюминиевым колпачком, снабженным пластиковым отрывным колпачком с гладкой поверхностью или с гравированной надписью «FLIP OFF». По 12 флаконов (с картонным разделителем между двумя рядами флаконов) вместе с инструкцией по применению в картонную пачку.	**Форма выпуска** **Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 2 г + 0,25 г, 4 г + 0,5 г.** Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 2 г + 0,25 г: по 2 г пиперациллина моногидрата и 0,25 г тазобактама во флаконы бесцветного стекла (тип I) вместимостью 30 мл, укупоренные бутилкаучуковой пробкой и закатанные алюминиевым колпачком, снабженным пластиковым отрывным колпачком с гладкой поверхностью или с гравированной надписью «Wyeth». По 12 флаконов (с картонным разделителем между двумя рядами флаконов) вместе с инструкцией по применению в картонную пачку.

Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 4 г + 0,5 г: по 4 г пиперациллина моногидрата и 0,5 г тазобактама во флаконы бесцветного стекла (тип I) вместимостью 70 мл, укупоренные бутилкаучуковой пробкой и закатанные алюминиевым колпачком, снабженным пластиковым отрывным колпачком с гладкой поверхностью или с гравированной надписью «FLIP OFF». По 12 флаконов (с картонным разделителем между двумя рядами флаконов) вместе с инструкцией по применению в картонную пачку.	Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 4 г + 0,5 г: по 4 г пиперациллина моногидрата и 0,5 г тазобактама во флаконы бесцветного стекла (тип I) вместимостью 70 мл, укупоренные бутилкаучуковой пробкой и закатанные алюминиевым колпачком, снабженным пластиковым отрывным колпачком с гладкой поверхностью или с гравированной надписью «Wyeth». По 12 флаконов (с картонным разделителем между двумя рядами флаконов) вместе с инструкцией по применению в картонную пачку.

Руководитель отдела регистрации
ООО «Пфайзер Инновации» Осипова С.А.

Общество с ограниченной ответственностью «Пфайзер Инновации» ОТДЕЛ РЕГИСТРАЦИИ Для документов * МОСКВА *