МИНЗДРАВ РОССИИ
№ П014527/01- 111213
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Гастроцепин®

наименование лекарственного препарата

таблетки 25 мг

лекарственная форма, дозировка

Берингер Ингельхайм Эллас А.Е., Греция

наименование производителя, страна

Изменение № 2

Дата внесения Изменения «____» 111213 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Противопоказания Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата, паралитический илеус у пациента. Максимально рекомендованная суточная доза содержит 833,64 мг лактозы. Пациентам, с имеющейся непереносимостью галактозы (галактоземией, дефицитом лактазы или нарушением всасывания глюкозы-галактозы в кишечнике) не следует применять это лекарственное средство. Детский возраст до 18 лет (не проводились исследования по эффективности и безопасности для этой группы пациентов). В качестве меры предосторожности рекомендуется избегать приема препарата в период беременности и лактации.	**Противопоказания** Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата, паралитический илеус у пациента. Беременность, период лактации. Максимально рекомендованная суточная доза содержит 833,64 мг лактозы. Пациентам, с имеющейся непереносимостью галактозы (галактоземией, дефицитом лактазы или нарушением всасывания глюкозы-галактозы в кишечнике) не следует применять это лекарственное средство. Детский возраст до 18 лет (не проводились исследования по эффективности и безопасности для этой группы пациентов).

Старая редакция	Новая редакция
Побочное действие Со стороны иммунной системы: анафилактические реакции, гиперчувствительность Со стороны нервной системы: головная боль Со стороны органа зрения: нарушение аккомодации Со стороны сердечно-сосудистой системы: тахикардия Со стороны пищеварительной системы: сухость во рту, запор, диаррея Со стороны кожи и подкожных тканей: сыпь Со стороны мочевыделительной системы: задержка мочи.	**Побочное действие** *Со стороны иммунной системы:* анафилактические реакции, гиперчувствительность *Со стороны нервной системы:* головная боль *Со стороны органа зрения:* нарушение аккомодации *Со стороны сердечно-сосудистой системы:* тахикардия *Со стороны пищеварительной системы:* сухость во рту, запор, диарея *Со стороны кожи и подкожных тканей:* сыпь *Со стороны мочевыделительной системы:* задержка мочи

Менеджер по регистрации Шаповалова В.Ю.