

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

КАТАЛИН / Catalin®

наименование лекарственного препарата

Торговое название препарата

КАТАЛИН / Catalin®

Лекарственная форма

таблетки для приготовления глазных капель 0,75 мг в комплекте с растворителем.

МНН или группировочное название

пиреноксин

Состав

(на 1 таблетку и 15 мл растворителя)

Активный компонент таблетки: пиреноксина натрия моногидрат (в пересчете на пиреноксин 0,75 мг) – 0,85 мг.

Вспомогательные компоненты таблетки: кислота аминэтилсульфоновая (таурин) – 62 мг, кислота борная – 12,15 мг.

Компоненты растворителя: кислота борная – 180 мг, натрия борат – 1,2 мг, калия хлорид – 24 мг, метилпарагидроксибензоат – 3 мг, пропилпарагидроксибензоат – 1,5 мг, вода очищенная – до 15 мл.

Описание

Таблетки от оранжево-красного до желтого цвета в комплекте с прозрачным бесцветным растворителем. После растворения прозрачный раствор от оранжево-красного до желтого цвета.

Код АТХ

S01XA.

Фармакотерапевтическая группа

Катаракты средство лечения.

Фармакологические свойства

Каталин обладает ингибирующим эффектом действия хиноновых соединений, процесса окисление жиров, действия редуктазы альдозы, которая является причиной диабетических осложнений, включая образование диабетической катаракты.

Фармакокинетика

Пиреноксин конкурентно ингибирует действие хиноновых веществ, продуцируемых в результате аномального метаболизма ароматических аминокислот, которые стимулируют превращение водорастворимого белка в хрусталике в нерастворимый, в результате чего вещество хрусталика мутнеет. Ингибируя действие хиноновых веществ, пиреноксин предотвращает развитие катаракты.

Показания для применения

Старческая катаракта.


Противопоказания

Индивидуальная непереносимость.

Способ применения и дозы

Применять только путем закапывания. Непосредственно перед использованием растворить одну таблетку в 15 мл растворителя и закапывать в конъюнктивальный мешок по 1-2 капли раствора 3-5 раз в день. Продолжительность курса терапии составляет 3 месяца.

Метод приготовления показан на рисунке.

**Меры предосторожности при применении**

При закапывании не следует касаться кончиком пипетки глаза.

Симптомы передозировки, меры по оказанию помощи при передозировке

До настоящего времени случаи передозировки не зарегистрированы.

Возможные побочные действия при применении лекарственного препарата

Поверхностный кератит, блефарит, гиперемия склер, зуд, жгучие боли в глазу.

С.3

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Не рекомендуется применять одновременно с глазными каплями, содержащими ионы металлов (растворы серебра, Колларгол, сульфат цинка), так как Каталин изменяет цвет в их присутствии.

Возможности и особенности применения беременными женщинами, женщинами в период грудного вскармливания, детьми

В связи с отсутствием до настоящего времени достаточных исследований, препарат не рекомендуется применять при беременности и в период грудного вскармливания.

Влияние лекарственного препарата на способность управлять транспортными средствами, механизмами

До настоящего времени возможность влияния препарата на способность управлять транспортными средствами не установлено.

Форма выпуска

1 таблетка в блистер из фольги алюминиевой и ПВХ-пленки и 15 мл прозрачного растворителя во флакон полипропиленовый янтарно-желтого цвета помещают вместе с инструкцией по применению в пачку картонную.

Срок годности

5 лет. После растворения использовать в течение 20 дней.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С. Не замораживать.

После растворения хранить в защищенном от света месте, при температуре не выше 15 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска из аптек

По рецепту врача.

Производитель

SENJU PHARMACEUTICAL CO., LTD	Сэндзю Фармацевтикал Ко., ЛТД
5-8 Hiranomachi 2-home,	5-8 Хираномачи 2-хоум,
Chuo-ku, Osaka, Japan	Чуо-ку, Осака, Япония


Представительство в России / Организация, принимающая претензии потребителей

ООО «Искра Сангио»

125009, Москва, ул. Тверская, д.12, стр.7, тел. +7 495 629 9636

Генеральный директор ООО «Искра Сангио»

Камолова Ф.Ф.



69479