

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного препарата

КАТАЛИН®/CATALIN®

таблетки для приготовления глазных капель 0,75 мг в комплекте с растворителем

Рег. удостоверение № П N012592/01 от 12.12.2008

СЭНДЗЮ ФАРМАЦЕВТИКАЛ КО., ЛТД., Япония

Изменение № 5

Дата внесения Изменения « ____ » **081021** 20 ____ г.

Старая редакция	Новая редакция
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНСТРУКЦИЯ по медицинскому применению лекарственного препарата КАТАЛИН / Catalin®	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНСТРУКЦИЯ по медицинскому применению лекарственного препарата КАТАЛИН® / CATALIN®
Способ применения и дозы Применять только путем закапывания. Непосредственно перед использованием растворить одну таблетку в 15 мл растворителя и закапывать в конъюнктивальный мешок по 1-2 капли раствора 3-5 раз в день. Продолжительность курса лечения определяется врачом. Метод приготовления показан на рисунке.	Способ применения и дозы Применять только путем закапывания. Непосредственно перед использованием растворить одну таблетку в 15 мл растворителя и закапывать в конъюнктивальный мешок по 1-2 капли раствора 3-5 раз в день. Продолжительность курса лечения определяется врачом. Метод приготовления показан на рисунке.

Старая редакция	Новая редакция
 1. Снимите белую большую крышку с флакона с растворителем. Если на отверстии горлышка флакона образовалась пленка, слегка надавите на флакон до её исчезновения. (Пожалуйста, обратите внимание, что соприкосновение места надлома блистера с пленкой приведет к намоканию таблетки, что вызовет затруднение с помещением таблетки внутрь флакона). 2. Не прикасаясь к линии сгиба возле стрелки, надломите блистер с таблеткой, как показано на рисунке. 3. Поместите таблетку во флакон непосредственно из блистера, не прикасаясь к таблетке. 4. Плотно закрутите белую крышку и интенсивно встряхивайте флакон, чтобы растворить таблетку. 5. Перед закапыванием снимите коричневую маленькую крышку, оставив белую большую крышку закрытой, иначе приготовленный раствор может вылиться.	 ① Снимите белую большую крышку с флакона с растворителем. Если на отверстии горлышка флакона образовалась пленка, слегка надавите на флакон до её исчезновения. (Пожалуйста, обратите внимание, что соприкосновение места надлома блистера с пленкой приведет к намоканию таблетки, что вызовет затруднение с помещением таблетки внутрь флакона). ② Не прикасаясь к линии сгиба возле стрелки, надломите блистер с таблеткой, как показано на рисунке. ③ Поместите таблетку во флакон непосредственно из блистера, не прикасаясь к таблетке. ④ Плотно закрутите белую крышку и интенсивно встряхивайте флакон, чтобы растворить таблетку. ⑤ Перед закапыванием снимите коричневую маленькую крышку, оставив белую большую крышку закрытой, иначе приготовленный раствор может вылиться.
Меры предосторожности при применении При закапывании не следует касаться кончиком флакона глаза. Если закапывать раствор сразу после извлечения флакона из прохладного места, особенно в случаях, когда во флаконе остается малое количество раствора, раствор может выливаться не капельно, а струйно. Данный эффект происходит из-за расширения прохладного воздуха во флаконе под воздействием на флакон тепла руки. Для избегания подобного эффекта нужно согреть флакон подержав его в руке некоторое время до закапывания.	Меры предосторожности при применении Перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом. При закапывании не следует касаться кончиком флакона глаза. Если закапывать раствор сразу после извлечения флакона из прохладного места, особенно в случаях, когда во флаконе остается малое количество раствора, раствор может выливаться не капельно, а струйно. Данный эффект происходит из-за расширения прохладного воздуха во флаконе под воздействием на флакон тепла руки. Для избегания подобного эффекта нужно согреть флакон подержав его в руке некоторое время до закапывания.
Побочное действие Диффузный поверхностный кератит, блефарит, гиперемия конъюнктивы, зуд, жгучие боли в глазу, контактный дерматит,	Побочное действие Диффузный поверхностный кератит, блефарит, гиперемия конъюнктивы, зуд, жгучие боли в глазу, контактный дерматит,

Старая редакция	Новая редакция
конъюнктивит, раздражение, слезотечение, выделения из глаз, ощущение дискомфорта и инородного тела в глазу, нечеткость зрения. Возможно возникновение аллергических реакций в связи с наличием в препарате парабенов. При возникновении нежелательных реакций, применение препарата следует прекратить.	конъюнктивит, раздражение, слезотечение, выделения из глаз, ощущение дискомфорта и инородного тела в глазу, нечеткость зрения. Возможно возникновение аллергических реакций в связи с наличием в препарате парабенов. При возникновении нежелательных реакций, указанных в инструкции, или каких-либо других не упомянутых нежелательных реакций, следует прекратить применение препарата и проконсультироваться с врачом.
Влияние лекарственного препарата на способность управлять транспортными средствами, механизмами До настоящего времени возможность влияния препарата на способность управлять транспортными средствами не установлено.	Влияние лекарственного препарата на способность управлять транспортными средствами, механизмами До настоящего времени возможность влияния препарата на способность управлять транспортными средствами не установлена.
Условия отпуска из аптек По рецепту врача.	Условия отпуска из аптек Без рецепта.

Генеральный директор
ООО «ОСТ Рус»



Д.Е. Шаров