МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

ПИРИДОКСИН

Торговое название

Пиридоксин

Международное непатентованное название (МНН)

Пиридоксин

Лекарственная форма

таблетки

Состав

Активное вещество: пиридоксина гидрохлорид – 10 мг.

Вспомогательные вещества: глюкоза – 268 мг, крахмал картофельный – 19,3 мг; кальция стеарат – 2,7 мг.

Описание

Таблетки белого цвета плоскоцилиндрической формы с фаской и риской. Допускается незначительная мраморность.

Фармакотерапевтическая группа

витамин

Код АТХ

A11HA02

Фармакологические свойства

Витамин В6. Поступая в организм, он фосфорилируется, превращается в пиридоксаль-5-фосфат и входит в состав ферментов, осуществляющих декарбоксилирование, трансаминирование рацемизацию аминокислот, а также ферментативное превращение серосодержащих и гидроксилированных аминокислот.

Участвует в обмене триптофана (участие в реакции биосинтеза серотонина). Изолированный дефицит пиридоксина встречается очень редко, главным образом у детей, находящихся на специальном искусственном питании (проявляется диареей, судорогами, анемией, может развиться периферическая невропатия).

Показания к применению

Лечение и профилактика гипо- и авитаминоза В6.

В комплексной терапии:

-заболеваний нервной системы (невралгии, синдром Меньера);

- в дерматологии (себорееподобных и несеборейных дерматитов, опоясывающего лишая, нейродермитов, псориаза, экссудативного диатеза и других заболеваний);

- сидеробластной анемии;

- острых и хронических гепатитов;

Профилактика и лечение нейротоксичности изониазида и других производных гидразида изоникотиновой кислоты.

Препарат увеличивает диурез и усиливает действие диуретиков.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С осторожностью:

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (в связи с возможным повышением кислотности желудочного сока), ишемическая болезнь сердца, тяжелые поражения печени.

Способ применения и дозы

Внутрь (после еды).

Для профилактики гипо- и авитаминоза В6 назначают взрослым по 2-5 мг в день, детям – по 2мг в день.

Лечебные дозы при приеме внутрь составляют для взрослых 50-100 мг 1-2 раза в день; для детей дозу уменьшают соответственно возрасту. Курс лечения составляет 1-2 месяца.

Для лечения сидеробластной анемии применяют внутрь по 100 мг ежедневно. Целесообразно одновременно принимать фолиевую кислоту, цианокобаламин, рибофлавин.

Для профилактики и лечения нейротоксичности производных гидразида изоникотиновой кислоты рекомендуется применять пиридоксин по 5-10 мг в день.

Меры предосторожности при применении

При тяжелых заболеваниях печени пиридоксин в больших дозах может вызвать ухудшение ее функции.

Передозировка

Симптомы передозировки возникают при введении пиридоксина в больших дозах (200-2000 мг/сут и более). Характерно развитие онемения кистей и стоп, появление в них чувства сдавления.

Меры помощи включают отмену препарата, симптоматическую терапию (введение малых доз неостигмина или галантамина для улучшения нейро-мышечной передачи). Специфического антидота нет.

Побочное действие

Аллергические реакции (кожные высыпания и другие), гиперсекреция соляной кислоты.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Пиридоксина гидрохлорид не применяют совместно с L-дофой (леводопа), поскольку ослабляется действие последнего.

Пиридоксина гидрохлорид не применяют совместно с L-дофой (леводопа), поскольку ослабляется действие последней.

Усиливает действие диуретиков.

Изоникотина гидразид, пеницилламин, циклосерин и эстрогенсодержащие пероральные контрацептивы ослабляют эффект пиридоксина.

Особые указания

При определении уробилиногена с помощью реагента Эрлиха пиридоксин может искажать результаты.

Применение при беременности и кормлении грудью

Возможно применение пиридоксина при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) по показаниям.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управление механизмами

Применение пиридоксина не отражается на способности пациента к управлению автотранспортным средством или иной операторской деятельности.

Форма выпуска

По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку.

По 10 таблеток в контурную безъячейковую упаковку из бумаги упаковочной с полимерным покрытием.

По 50 таблеток в банку из светозащитного стекла, или в банку или флакон из полимерных материалов.

Каждую банку или флакон, или 1, 2, 3, 4 или 5 контурных ячейковых упаковок по 10 таблеток вместе с инструкцией по применению в пачку из картона.

Допускается банки полимерные или флаконы полимерные без пачек, контурные безъячейковые упаковки с равным количеством инструкций по применению помещать в групповую упаковку.

Срок годности:

3 года. Не использовать после срока годности указанного на упаковке.

Условия хранения:

В сухом, защищённом от света, недоступном для детей месте.

Условия отпуска из аптек:

Без рецепта врача.

Производитель

ОАО «ВЕРОФАРМ»

Юридический адрес: Россия, 107023, г. Москва, Барабанный пер., д. 3.

Адрес производства: Россия, 308013, г. Белгород, ул. Рабочая, д.14.

Тел. (0722) 21-32-26; 21-34-71

Начальник Медицинского управления Скоблик Т.И.