ЛП-№(005971)-(РГ-RU) от 28.01.2026

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 21.06.2024 № 12461
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
ДЕРМА-КАП

Регистрационный номер:

Торговое наименование

ДЕРМА-КАП

Международное непатентованное или группировочное наименование

Пиритион цинк

Лекарственная форма

Крем для наружного применения

Состав на 1 г

Действующее вещество: пиритион цинк – 2,0 мг.

Вспомогательные вещества: макрогола цетостеарат - 12,0 мг, цетостеариловый спирт - 68,0 мг, парафин жидкий (масло вазелиновое) - 200,0 мг, пропиленгликоль - 292,5 мг, декспантенол - 6,0 мг, натрия дигидрофосфата дигидрат - 0,4 мг, натрия гидрофосфата додекагидрат - 1,5 мг, вода очищенная - до 1,0 г.

Описание

Крем белого или белого с желтоватым оттенком цвета без запаха или со слабым специфическим запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Другие препараты, применяемые в дерматологии.

Код АТХ: D11AX12

Фармакологические свойства

Пиритион цинк обладает противовоспалительной, антибактериальной и противогрибковой активностью. Антибактериальная активность пиритиона цинка проявляется в отношении ряда грамположительных и грамотрицательных бактерий (*Streptococcus spp.*,

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 21.06.2024 № 12461
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Staphylococcus spp., *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Proteus spp*.). Пиритион цинк снижает внутриклеточный уровень АТФ, способствует деполяризации клеточных мембран, вызывая гибель грибов и бактерий. Противогрибковая активность особенно выражена в отношении грибов рода *Malassezia* (ранее – *Pityrosporum ovale* и *Pityrosporum orbiculare*), вызывающих воспаление и избыточное шелушение при перхоти, себорейном дерматите, псориазе и других заболеваниях кожи. Механизм противовоспалительного действия не изучен.

Фармакокинетика

Системная абсорбция незначительная. Препарат обнаруживается в крови в следовых количествах.

Показания к применению

- псориаз;
- атопический дерматит, экзема;
- себорейный дерматит;
- сухость кожи.

В случае необходимости, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед применением лекарственного препарата.

Противопоказания

Гиперчувствительность к пиритион цинку или к любому из вспомогательных веществ, детский возраст до 1 года.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Перед применением препарата ДЕРМА-КАП, если Вы беременны, или предполагаете, что Вы могли бы быть беременной, или планируете беременность, необходимо проконсультироваться с врачом. В период грудного вскармливания необходимо проконсультироваться с врачом. При беременности и в период грудного вскармливания препарат следует назначать в случаях, когда ожидаемая польза терапии для матери превышает потенциальный риск для плода или грудного ребенка. Не сообщалось о развитии каких-либо негативных последствий при применении препаратов пиритиона цинка беременными женщинами и женщинами в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Наружно.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 21.06.2024 № 12461
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Применяют у взрослых и детей с 1 года.

Крем наносят тонким слоем на пораженные участки 2-3 раза в сутки.

Длительность лечения при:

- псориазе - 1-1,5 месяца, повторные курсы - при появлении признаков обострения;
- атопическом дерматите - 3-4 недели;
- себорейном дерматите - 2 недели.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции по применению.

Побочное действие

Классификация частоты возникновения побочных реакций:

очень часто (≥ 1/10); часто (≥ 1/100, < 1/10); нечасто (≥ 1/1000, < 1/100); редко (≥ 1/10000, < 1/1000); очень редко (< 1/10000), включая отдельные сообщения, частота неизвестна – по имеющимся данным установить частоту возникновения не представлялось возможным.

Препарат обычно хорошо переносится. Иногда отмечаются аллергические реакции.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

До настоящего времени о случаях передозировки пиритион цинком не сообщалось.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Клинически значимого взаимодействия пиритиона цинка с другими лекарственными препаратами не выявлено.

Особые указания

Внимательно прочитайте инструкцию по медицинскому применению перед тем, как начать применение препарата, так как она содержит важную для Вас информацию.

- Сохраняйте инструкцию, она может понадобиться вновь.
- Если у Вас возникли вопросы, обратитесь к врачу.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 21.06.2024 № 12461
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

- Лекарственное средство, которым Вы лечитесь, предназначено лично Вам, и его не следует передавать другим лицам, поскольку оно может причинить им вред даже при наличии тех же симптомов, что и у Вас.

Требуется курсовое лечение.

Меры предосторожности при применении:

ДЕРМА-КАП крем предназначен для наружного применения.

Следует избегать попадания его в глаза, так как он может вызвать раздражение. При случайном попадании препарата в глаза, их следует немедленно промыть проточной водой, а в случае развития стойких явлений раздражения необходимо проконсультироваться с врачом.

Входящий в состав крема цетостеариловый спирт, может вызывать местные кожные реакции (например, контактный дерматит), пропиленгликоль может вызывать раздражение кожи.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

ДЕРМА-КАП крем не оказывает отрицательного влияния на способность управлять транспортными средствами и выполнять другие виды деятельности, требующие концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Крем для наружного применения 0,2 %.

По 15, 25, 50 г в тубы алюминиевые, укупоренные бушоном.

По 15, 25, 50 г в тубы из комбинированного материала, укупоренные бушоном.

Каждую тубу вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 21.06.2024 № 12461
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Производитель/Организация, принимающая претензии:

ООО «Тульская фармацевтическая фабрика»

Россия, 300004, г. Тула, Торховский проезд, д. 10

Тел./факс: (4872) 41-04-73.