ЛП-№(012478)-(РГ-RU) от 18.11.2025

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 12.11.2025 № 28235
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

СКИН-КАП

Регистрационный номер:

Торговое наименование: СКИН-КАП

Международное непатентованное наименование: пиритион цинк

Лекарственная форма: аэрозоль для наружного применения

Состав:

100 г содержат:

действующее вещество: пиритион цинк активированный – 200 мг;

вспомогательные вещества: изопропилмиристат, полисорбат-80, троламин, этанол, вода, пропелленты: изобутан, пропан, бутан.

Описание: маслянистый раствор от белого с желтоватым оттенком до светло-желтого цвета с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа: другие препараты, применяемые в дерматологии.

Код АТХ: D11AX12

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Пиритион цинк активированный обладает противовоспалительной, антибактериальной и противогрибковой активностью. Противогрибковая активность особенно выражена в отношении грибов рода *Malassezia* (ранее - *Pityrosporum ovale* и *Pityrosporum orbiculare*), поддерживающих воспаление и избыточное шелушение при перхоти, себорее, псориазе и других заболеваниях кожи. Антибактериальная активность цинка пиритиона активированного проявляется в отношении ряда патогенных микроорганизмов (стрептококк, стафилококк, синегнойная и кишечная палочки, протей и другие). Пиритион цинк активированный снижает внутриклеточный уровень АТФ, способствует деполяризации клеточных мембран, вызывая гибель грибов и бактерий.

Фармакокинетика

При наружном применении пиритион цинк активированный депонируется в эпидермисе и поверхностных слоях дермы. Системная абсорбция незначительная. Препарат

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 12.11.2025 № 28235
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

обнаруживается в крови в следовых количествах.

Показания к применению

Препарат СКИН-КАП показан к применению у взрослых пациентов и у детей старше 1 года для лечения следующих состояний:

- псориаз;
- атопический дерматит, нейродермит;
- экзема;
- себорейный дерматит.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Перед применением препарата СКИН-КАП, если Вы беременны, или предполагаете, что Вы можете быть беременной, или планируете беременность, необходимо проконсультироваться с врачом. В период грудного вскармливания необходимо проконсультироваться с врачом. При беременности и в период грудного вскармливания препарат следует назначать в случаях, когда ожидаемая польза терапии для матери превышает потенциальный риск для плода или грудного ребенка. Не сообщалось о развитии каких-либо негативных последствий при применении препаратов пиритиона цинка активированного беременными женщинами и женщинами в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Наружно.

Применяют у взрослых и детей с 1 года.

После интенсивного встряхивания препарат в достаточном количестве с расстояния около 15 см распыляют на пораженные участки кожи 2-3 раза в день до достижения клинического эффекта. Для достижения стойкого эффекта применение препарата рекомендуется продолжить в течение одной недели после исчезновения симптомов. Во время распыления флакон держать вертикально. Для обработки лекарственным препаратом волосистой части головы прилагается специальная насадка.

Длительность лечения при псориазе - 1-1,5 месяца, атопическом дерматите - 3-4 недели, себорейном дерматите - 2 недели.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 12.11.2025 № 28235
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

При необходимости можно провести повторный курс лечения после консультации с врачом.

Побочное действие

Препарат обычно хорошо переносится. Иногда отмечаются аллергические реакции.

В первые дни лечения возможно кратковременное чувство жжения в месте нанесения препарата, которое, как правило, не требует отмены препарата.

Передозировка

До настоящего времени о случаях передозировки пиритиона цинка активированного не сообщалось.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Клинически значимого взаимодействия пиритиона цинка активированного с другими лекарственными препаратами не выявлено.

Особые указания

Аэрозоль СКИН-КАП предназначен для наружного применения.

Следует избегать попадания аэрозоля СКИН-КАП в глаза.

Вспомогательные вещества

Препарат СКИН-КАП содержит этанол, который может вызвать чувство жжения на поврежденной коже.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат СКИН-КАП не оказывает отрицательного влияния на способность управлять транспортными средствами и выполнять другие виды деятельности, требующие концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Аэрозоль для наружного применения 0,2 %.

По 35 г, 70 г и 140 г препарата в алюминиевый аэрозольный баллон, который состоит из клапана и крышки. К баллону прилагается дополнительная насадка. Баллон вместе с дополнительной насадкой и инструкцией по медицинскому применению помещают в картонную пачку.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 12.11.2025 № 28235
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

По 35 г препарата в алюминиевый аэрозольный баллон, который состоит из клапана и крышки («бесплатный образец»). К каждому баллону прилагается инструкция по медицинскому применению, помещенная под крышку.

Условия хранения

При температуре от +4 до +30 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

5 лет.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения

Россия, ООО «Инвар», 107023, г. Москва, пл. Журавлева, д. 2 стр.2

Тел.: 8 (495) 544-51-54, 8 (800) 333-60-02

E-mail: info@invar.ru

Производитель

Производство по заказу «Хемигруп Франс С.А.», Франция («Мерибель Фарма Паретс, С.Л.У.», Барселона, Испания) для ООО «Инвар®», Россия.

Организация, принимающая претензии потребителей

Россия, ООО «Инвар», 107023, г. Москва, пл. Журавлева, д. 2 стр.2

Тел.: 8 (495) 544-51-54, 8 (800) 333-60-02

E-mail: info@invar.ru