ЛП-№(011540)-(РГ-RU) от 03.09.2025

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 28.08.2025 № 21476
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

СКИН-КАП

Регистрационный номер:

Торговое наименование: СКИН-КАП

Международное непатентованное или группировочное наименование: пиритион цинк

Лекарственная форма: шампунь

Состав:

100 мл содержат:

действующее вещество: пиритион цинк активированный — 1 г;

вспомогательные вещества: натрия лаурилсульфат водный раствор 26,5% (EASYCOL ES 27), кокамидопропилбетаин водный раствор 30% (EMPIGEN® BS/FA), POLIGEL W400 (сополимер акриловых кислот), TEGO® Pearl N 100 (гликоля дистеарат, стеарет-4, натрия бензоат, вода), этанол, ABIL® B 88183 PH (диметикона, макрогола и пропиленгликоля сополимер, пропиленгликоль, вода), левоментол, ароматизатор BINEA, динатрия эдетат, основа SK INFLUX (керамид NP, керамид AP, керамид EOP, фитоспингозин, холестерол, натрия лауриллактат, карбомер, камедь ксантановая, вода очищенная), метилпарабен, альфа-токоферола ацетат, вода очищенная.

Описание: суспензия белого цвета с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа: другие препараты, применяемые в дерматологии.

Код АТХ: D11AX12

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Пиритион цинк активированный обладает противовоспалительной, антибактериальной и противогрибковой активностью. Противогрибковая активность особенно выражена в отношении грибов рода *Malassezia* (ранее — *Pityrosporum ovale* и *Pityrosporum orbiculare*), вызывающих воспаление и избыточное шелушение при перхоти, себорее, псориазе и других заболеваниях кожи. Антибактериальная активность пиритиона цинка активированного проявляется в отношении ряда грамположительных и

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 28.08.2025 № 21476
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

грамотрицательных бактерий (*Streptococcus* spp., *Staphylococcus* spp., *Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Proteus* spp.). Пиритион цинк активированный снижает внутриклеточный уровень АТФ, способствует деполяризации клеточных мембран, вызывая гибель грибов и бактерий. Механизм противовоспалительного действия не изучен.

Фармакокинетика

При наружном применении пиритион цинк активированный депонируется в эпидермисе и поверхностных слоях дермы. Системная абсорбция незначительная. Препарат обнаруживается в крови в следовых количествах.

Показания к применению

Псориаз, атопический дерматит волосистой части головы, себорейный дерматит, зуд, перхоть, жирная и сухая себорея.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

При беременности и в период грудного вскармливания препарат следует назначать в случаях, когда ожидаемая польза терапии для матери превышает потенциальный риск для плода или грудного ребенка. Не сообщалось о развитии каких-либо негативных последствий при применении препаратов пиритиона цинка активированного беременными женщинами и женщинами в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Наружно.

Перед применением интенсивно встряхнуть флакон. Нанести небольшое количество шампуня СКИН-КАП на влажные волосы и помассировать кожу головы.

Промыть волосы и повторно нанести шампунь. Оставить шампунь на волосах в течение 5 минут и тщательно промыть большим количеством воды.

Применять 2–3 раза в неделю в течение первых двух недель. Курс лечения при псориазе — 5 недель, при себорее — 2 недели.

В период ремиссии шампунь может использоваться 1–2 раза в неделю в качестве средства профилактики рецидивов.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 28.08.2025 № 21476
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

Побочное действие

Препарат обычно хорошо переносится. Редко отмечаются аллергические реакции.

Передозировка

До настоящего времени о случаях передозировки пиритиона цинка активированного не сообщалось.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Клинически значимого взаимодействия пиритиона цинка активированного с другими лекарственными препаратами не выявлено.

Особые указания

Шампунь СКИН-КАП не влияет на естественный цвет и состояние волос.

Шампунь СКИН-КАП предназначен для наружного применения.

Следует избегать попадания шампуня СКИН-КАП в глаза

Вспомогательные вещества

Препарат СКИН-КАП содержит натрия бензоат, который может вызывать местное раздражение.

Препарат СКИН-КАП содержит пропиленгликоль, который может вызывать раздражение кожи.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Шампунь СКИН-КАП не оказывает отрицательного влияния на способность управлять транспортными средствами и выполнять другие виды деятельности, требующие концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Шампунь 1%.

По 5 г в саше из ламинированной фольги (бесплатный образец).

По 50 мл, 150 мл, 400 мл в пластиковый флакон. Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку картонную.

По 5 г в саше из ламинированной фольги. По 5 саше вместе с инструкцией по применению помещают в пачку картонную.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 28.08.2025 № 21476
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

Условия хранения

При температуре от +4 до +30 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

5 лет.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения

ООО «Инвар», Россия, 107023, г. Москва, пл. Журавлева, д. 2, стр. 2.

Тел.: +7 (495) 544-51-54, +7 (800) 333-60-02.

Производитель

Производство по заказу «Хемигруп Франс С.А.», Франция («Б.Браун Медикал С.А.», Хаен, Испания) для ООО «Инвар®», Россия.

Организация, принимающая претензии потребителей

Россия, ООО «Инвар», Россия, 107023, г. Москва, пл. Журавлева, д. 2, стр. 2.

Тел.: +7 (495) 544-51-54, +7 (800) 333-60-02.

E-mail: info@invar.ru