ЛП-№(009127)-(РГ-RU) от 04.03.2025

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 28.02.2025 № 5574
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
Цинокап®

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Цинокап®

Международное непатентованное или группировочное наименование: пиритион цинк

Лекарственная форма: аэрозоль для наружного применения

Состав на один баллон

При фасовке препарата по 35 г:

действующее вещество: пиритион цинк (в пересчете на 100 % вещество) – 0,060 г;

вспомогательные вещества: натрия лаурилсульфат – 0,030 г, изопропилмиристат – 20,214 г, кремния диоксид коллоидный – 0,453 г, декспантенол (D-Пантенол) – 0,181 г, полисорбат-80 (твин-80) – 0,151 г, этанол 70 % (спирт этиловый 70 %) – 9,081 г, тетрафторэтан (хладон 134а) – до 35,000 г.

При фасовке препарата по 58 г:

действующее вещество: пиритион цинк (в пересчете на 100 % вещество) – 0,100 г;

вспомогательные вещества: натрия лаурилсульфат – 0,050 г, изопропилмиристат – 33,500 г, кремния диоксид коллоидный – 0,750 г, декспантенол (D-Пантенол) – 0,300 г, полисорбат-80 (твин-80) – 0,250 г, этанол 70 % (спирт этиловый 70 %) – 15,050 г, тетрафторэтан (хладон 134а) – до 58,000 г.

Описание: маслянистая жидкость от белого до светло-желтого цвета с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа: другие препараты, применяемые в дерматологии

Код АТХ: D11AX12

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Пиритион цинк обладает противовоспалительной, антибактериальной и противогрибковой активностью. Антибактериальная активность пиритиона цинка проявляется в отношении ряда грамположительных и грамотрицательных бактерий (*Streptococcus spp., Staphylococcus*

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 28.02.2025 № 5574
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

spp., Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Proteus spp.). Пиритион цинк снижает внутриклеточный уровень АТФ, способствует деполяризации клеточных мембран, вызывая гибель грибов и бактерий. Противогрибковая активность особенно выражена при действии на *Pityrosporum ovale* и *Pityrosporum orbiculare*, вызывающих воспаление и избыточное шелушение при перхоти, себорейном дерматите, псориазе и других заболеваниях кожи. Механизм противовоспалительного действия не изучен.

Фармакокинетика

Системная абсорбция незначительная. Препарат обнаруживается в крови в следовых количествах.

Показания к применению

- псориаз
- себорейный дерматит
- атопический дерматит (экзема, нейродермит)

Противопоказания

Гиперчувствительность, детский возраст до 1 года.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Перед применением препарата Цинокап®, если Вы беременны, или предполагаете, что Вы могли бы быть беременной, или планируете беременность, необходимо проконсультироваться с врачом. В период грудного вскармливания необходимо проконсультироваться с врачом. При беременности и в период грудного вскармливания препарат следует назначать только в случаях, когда ожидаемая польза терапии для матери превышает потенциальный риск для плода или грудного ребенка. Не сообщалось о развитии каких-либо негативных последствий при применении препаратов пиритиона цинка беременными женщинами и женщинами в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Препарат предназначен для наружного применения.

Применяют у взрослых и детей с 1 года.

Перед применением баллон встряхнуть. Распылять препарат на пораженный участок кожи с расстояния 15 см 2–3 раза в день до достижения клинического эффекта. Для обработки препаратом волосистой части головы прилагается дополнительная насадка. Применение препарата желательно продолжить в течение одной недели после исчезновения симптомов.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 28.02.2025 № 5574
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Длительность лечения при:

- псориазе 1–1,5 месяца, повторные курсы – при появлении признаков обострения;
- себорейном дерматите 2 недели;
- атопическом дерматите 3–4 недели.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции по применению.

Побочное действие

Препарат обычно хорошо переносится. Редко отмечаются аллергические реакции. В первые дни лечения возможно кратковременное чувство жжения в месте нанесения препарата, которое, как правило, не требует его отмены. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

До настоящего времени о случаях передозировки пиритиона цинка не сообщалось.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Клинически значимого взаимодействия пиритиона цинка с другими лекарственными препаратами не выявлено.

Особые указания

Внимательно прочитайте инструкцию по медицинскому применению перед тем, как начать применение препарата, так как она содержит важную для Вас информацию.

- Сохраняйте инструкцию, она может понадобиться вновь.
- Если у Вас возникли вопросы, обратитесь к врачу.
- Лекарственное средство, которым Вы лечитесь, предназначено лично Вам, и его не следует передавать другим лицам, поскольку оно может причинить им вред даже при наличии тех же симптомов, что и у Вас.

При распылении баллон держать вертикально.

Не переворачивать.

Требуется курсовое лечение.

Меры предосторожности при применении:

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 28.02.2025 № 5574
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Цинокап® аэрозоль предназначен для наружного применения.

Следует избегать попадания его в глаза, так как он может вызвать раздражение. При случайном попадании препарата в глаза, их следует немедленно промыть проточной водой, а в случае развития стойких явлений раздражения необходимо проконсультироваться с врачом.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат не влияет на способность управлять транспортом или заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Аэрозоль для наружного применения, 0,2 %.

По 35 г или 58 г в баллоны аэрозольные алюминиевые, снабженные клапанами непрерывного действия и защитными колпачками.

На баллон наносят текст этикетки методом трафаретной или сухой офсетной печати или самоклеящуюся этикетку.

Баллон вместе с распылителем для наружного применения, дополнительной насадкой и инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

При температуре от 4 до 30 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения/организация, принимающая претензии потребителей

Акционерное общество "Отисифарм" (АО "Отисифарм"), Россия

123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, эт. 12, пом. II, ком. 29

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 28.02.2025 № 5574
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Тел.: +7 (800) 775-98-19

Факс: +7 (495) 221-18-02

www.otcpharm.ru

Производитель

Открытое акционерное общество "Фармстандарт-Лексредства" (ОАО "Фармстандарт-Лексредства"), Россия

Курская обл., г. Курск, ул. 2-я Агрегатная, д. 1а/18,

тел./факс: (4712) 34-03-13,

www.pharmstd.ru