**Инструкция**
**по медицинскому применению препарата**
**ФИНАЛГЕЛЬ®**

**Регистрационный номер:**

**Торговое (патентованное) название:** Финалгель®

**Международное непатентованное название:** пироксикам

**Лекарственная форма**
гель для наружного применения

**Состав**:
В 1 г геля содержится: активного вещества пироксикама - 5 мг

Вспомогательные вещества: пропиленгликоль, изопропанол, макрогола глицерилкокоат (цетиол HE), гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза), натрия гидроксид, натрия дисульфит (натрия метабисульфит), калия дигидрофосфат, вода очищенная

**Описание:**
Прозрачный или слегка опалесцирующий светло-желтого цвета гель со слабым запахом изопропилового спирта

**Фармакотерапевтическая группа:** нестероидный противовоспалительный препарат (НПВП)
Код АТХ: M02AA07

**Фармакологические свойства**
Обладает противовоспалительным, обезболивающим, местным охлаждающим действием. Неселективно подавляет циклооксигеназу 1 и 2.

**Фармакокинетика**
После нанесения 4 г препарата на кожу максимальная концентрация пироксикама в системном кровотоке составляет 149,2 ± 30,3 нг / мл.

**Показания**
Болевой синдром: анкилозирующий спондилоартрит, остеоартроз, ревматоидный артрит, ювенильный хронический артрит, тендинит, тендовагинит, плече-лопаточный синдром; спортивные травмы (ушибы, вывихи, повреждение связок).

**Противопоказания**
- гиперчувствительность к пироксикаму или другим компонентам препарата;
- гиперчувствительность к ацетилсалициловой кислоте или к другим НПВП;
- беременность (III триместр);
- почечная недостаточность;
- возраст до 14 лет.

Boehringer Ingelheim
5 6 4 6 0

***С осторожностью***
бронхиальная астма, аллергический ринит, рецидивирующий полипоз носа и околоносовых пазух, хронические обструктивные заболевания легких или хронические легочные инфекции.
***Беременность и период лактации***
Финалгель® следует с осторожностью применять во время I и II триместра беременности.
Пироксикам в незначительных количествах может проникать в грудное молоко, поэтому не рекомендуется применять препарат в период кормления грудью.

**Способ применения и дозы**
Наружно. Взрослым и детям старше 14 лет по 1 г геля (примерно соответствует размеру лесного ореха) 3-4 раза в день. Гель следует нанести на кожу над пораженной областью и слегка втереть.
Продолжительность лечения зависит от выраженности симптомов и в среднем составляет 2-3 недели при тендинитах, тендовагинитах и плече-лопаточном синдроме; 1-2 недели при спортивных травмах.

**Побочное действие**
- местное раздражение кожи (воспаление, покраснение, крапивница, зуд, шелушение);
- местные аллергические реакции.

**Передозировка**
При применении препарата в дозах, превышающих рекомендуемые, в единичных случаях не исключается возникновение системных побочных эффектов: головной боли; нарушений со стороны желудочно-кишечного тракта (тошнота, боль в эпигастральной области); одышки.
Описан единичный случай развития интерстициальноого нефрита с функциональной почечной недостаточностью и нефротическим синдромом.
В случае появления симптомов передозировки препарат следует отменить и обратиться к врачу.
Лечение: симптоматическое.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами**
Не известно.

**Особые указания**
Пациенты, страдающие бронхиальной астмой, аллергическим ринитом, рецидивирующим полипозом носа и околоносовых пазух, хроническими обструктивными заболеваниями легких или хроническими легочными инфекциями, как правило, более чувствительны к применению НПВП. У этих пациентов могут участиться приступы астмы, появиться отек Квинке и крапивница.
Не следует наносить гель на поврежденные кожные покровы, в том числе открытые раны. Избегать попадания в глаза.

***Влияние на способность водить машину или работать с механизмами***
Не известно.

**Форма выпуска**
Гель для наружного применения 0,5%. По 35 г или 50 г в тубу алюминиевую, закрытую колпачком из пластмассы с пробойником для мембраны. Тубу с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

Boehringer Ingelheim
5646

**Условия хранения**
При температуре не выше 25°С, в недоступном для детей месте.

**Срок годности**
5 лет. 6 месяцев с момента вскрытия тубы.
Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

**Условия отпуска из аптек**
Без рецепта.

**Производитель**
Берингер Ингельхайм Интернешнл ГмбХ,
Бингерштрассе, 173, 55216 Ингельхайм-на-Рейне, Германия,
произведено С.П.М. КонтрактФарма ГмбХ и Ко. КГ, Фрюлингштрассе, 7, 83620 Фельдкирхен-Вестерхам, Германия.

**Претензии потребителей направлять по адресу Представительства в Москве:**
119049, Москва, ул. Донская, 29/9, строение 1
тел: (495) 411-78-01; факс: (495) 411-78-02

Представитель фирмы Шаповалова В.Ю.




