

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Абисил®

Регистрационный номер

Торговое наименование

Абисил®

Международное непатентованное или группировочное наименование

Пихты сибирской терпены

Лекарственная форма

Раствор для местного и наружного применения масляный

Состав

В 100 г содержатся:

Действующее вещество: абисил (пихты сибирской терпены) с содержанием борнилацетата не менее 10 % – 20 г.

Вспомогательное вещество: масло подсолнечное – до 100 г.

Описание

Густая маслянистая жидкость от желтого до молочно-белого цвета с характерным запахом.

При хранении возможно расслоение, исчезающее при встряхивании.

Фармакотерапевтическая группа: Прочие лечебные средства.

Код АТХ: V03AX

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Препарат оказывает выраженное противовоспалительное, ранозаживляющее, антибактериальное, обезболивающее, антиэкссудативное действие, обусловленное свойствами природных терпеноидов, входящих в его состав. Обладает широким спектром противомикробной активности в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, в том числе и к антибиотикоустойчивым штаммам. Создает оптимальные условия для заживления раневой поверхности мягких тканей, ускоряет процесс эпителизации, улучшает микроциркуляцию.

Препарат не обладает токсическими свойствами, тератогенных, мутагенных и канцерогенных эффектов не выявлено, что позволяет его применять во всех возрастных группах.

Фармакокинетика

При местном и наружном применении препарат не всасывается, в связи с чем проведение фармакокинетических исследований не представляется возможным.

Показания к применению

Препарат показан к применению при следующих состояниях:

В оториноларингологии: отит, евстахиит, синусит, ринит, ринофарингит, фарингит, тонзилит, состояния после тонзиллэктомии, ларингит.

В стоматологии: пародонтоз, стоматит, гингивит, альвеолит, осложнения при протезировании зубов.

В дерматологии: рожистое воспаление, пиодермии (поверхностные стафило- и стрепто-дермии).

В общехирургической практике: гнойно-воспалительные заболевания кожи и мягких тканей (трофические язвы и длительно незаживающие гнойные послеоперационные и посттравматические раны, свищи, пролежни, ожоги и обморожения, абсцессы и флегмоны, в том числе челюстно-лицевой области).

Противопоказания

Гиперчувствительность к пихте сибирской терпенам или к любому из вспомогательных веществ, детский возраст до 3 лет (эффективность и безопасность не установлены).

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение при беременности и в период грудного вскармливания возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы

Местно, наружно.

При отитах: ввести в наружный слуховой проход тампон, смоченный препаратом.

При лечении ринита, синусита: закапывают в каждый носовой ход по 1–2 капли 3–4 раза в сутки. При гайморитах препарат вводят в гайморову пазуху после ее предварительной санации.

При лечении тонзиллита и других воспалительных заболеваний горла: обрабатывать препаратом слизистые оболочки 2–3 раза в сутки.

При воспалительных процессах в челюстно-лицевой области: после вскрытия и хирургической обработки абсцессов и флегмон в карманы и послеоперационные раны вводят тампоны, пропитанные препаратом. Процедуру повторяют ежедневно 5–7 дней.

При заболеваниях полости рта: обрабатывать пораженную поверхность слизистой оболочки 2–3 раза в день или применять турунды, смоченные препаратом.

При заболеваниях кожи (рожистое воспаление, пиодермии): препарат наносят 1–3 раза в сутки тонким слоем на пораженные участки. Продолжительность курса индивидуальна и зависит от тяжести заболевания.

При гнойно-воспалительных заболеваниях кожи и мягких тканей предварительно проводят хирургическую обработку раневой поверхности и затем наносят препарат 1–2 раза в сутки равномерным тонким слоем. Длительность лечения зависит от формы и тяжести заболевания (обычно 5–10 дней) и заканчивается при появлении свежих грануляций, островков эпителия или полной эпителизации.

Если в период лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции, в том числе у пациентов с повышенной чувствительностью к эфирным маслам, кратковременное ощущение жжения в месте нанесения препарата.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

До настоящего времени сведения о передозировке препарата не зарегистрированы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не следует комбинировать с другими наружными средствами.

Особые указания

Перед применением флакон с препаратом необходимо взбалтывать.

Не допускать попадания препарата на конъюнктиву глаза, при попадании достаточно промыть глаз водой.

Не следует наносить на влажную кожу.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты

психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

Форма выпуска

Раствор для местного и наружного применения масляный 20 %.

По 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 100 мл во флаконы оранжевого стекла, укупоренные пробками полиэтиленовыми и крышками пластмассовыми навинчиваемыми.

По 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 100 мл во флаконы коричневого стекла, укупоренные крышками навинчиваемыми с контролем вскрытия и капельницей.

По 10, 15, 20, 25 или 50 мл во флаконы коричневого стекла, укупоренные крышками с пипетками.

По 10, 15, 20 или 25 мл во флаконы-капельницы оранжевого стекла, укупоренные пробкой-капельницей и крышкой.

Флакон, флакон-капельницу вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

5 лет.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения

ООО "Инитиум-Фарм", Россия

142001, Московская область, г. Домодедово, Каширское ш., д. 7, офис 509Б

тел.: 8 800 234 83 04

www.initium-pharm.com

Производитель/Организация, принимающая претензии потребителей

АО "Татхимфармпрепараты", Россия

420091, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, д. 260

тел.: 8 800 201 98 88, тел./факс: +7 (843) 571-85-58

e-mail: marketing@tatpharm.ru