

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ПЕРЦА СТРУЧКОВОГО НАСТОЙКА (Tinctura Capsici)

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Перца стручкового настойка

Международное непатентованное или группировочное наименование:

Перца стручкового настойка

Лекарственная форма: настойка

Состав

Для приготовления 1000 мл настойки используют:

Перца стручкового плодов измельченных – 100 г

Вспомогательное вещество:

Спирта этилового 90 % (этанолa) – до получения 1000 мл настойки

Описание

Прозрачная жидкость красновато-желтого цвета.

Фармакотерапевтическая группа: препараты для наружного применения при мышечных и суставных болях; капсаицин и подобные средства.

Код АТХ: M02AB

Фармакологическое действие

Фармакологические свойства настойки перца стручкового обусловлены содержанием алкалоида капсаицина. Препарат обладает местным раздражающим, отвлекающим и разогревающим действием, вызывая усиление местного кровотока в коже, воздействуя на болезненные процессы, локализованные также и в глубине тканей.

Показания к применению

В качестве местнораздражающего и отвлекающего средства: невралгии, радикулиты, миозиты, люмбаго, люмбаишиалгии.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 12 лет. Дерматологические заболевания в месте предполагаемого нанесения настойки; нарушение целостности кожных покровов.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение при беременности и в период грудного вскармливания возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы

Препарат применяют наружно.

Небольшое количество настойки втирают в соответствующий участок кожи 1-2 раза в сутки.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции, сильное жжение в месте нанесения препарата.

Если у Вас отмечаются нежелательные реакции, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие нежелательные реакции, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не зарегистрированы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не описано.

Особые указания

Не допускать попадания препарата в глаза. Препарат не следует наносить на слизистые оболочки, открытые раны и поврежденные или воспалённые участки кожи. После применения настойки необходимо тщательно вымыть руки теплой водой с мылом. При попадании препарата в рот или нос следует тщательно промыть их водой.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

Форма выпуска

Настойка.

По 25 мл, 100 мл во флаконы оранжевого стекла с винтовой горловиной, укупоренные пробками из полиэтилена высокого давления и крышками навинчиваемыми из полиэтилена низкого давления или крышками унифицированными укупорочно-навинчиваемыми из полиэтилена низкого давления, или колпачками алюминиевыми.

На флаконы наклеивают этикетки из бумаги этикеточной или писчей.

Каждый флакон помещают в пачку картонную, полный текст инструкции наносится на пачку.

Условия хранения

Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

4 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения

Российская Федерация,

ООО «Научно-исследовательский институт Медицины и Стандартизации»

141070, г. Королев, ул. Фрунзе, д. 1А, пом. III, оф. 208

Телефон: +7 968 353 67 95

e-mail: ooo.niimis@mail.ru

Организация, принимающая претензии

Российская Федерация,

ООО «Научно-исследовательский институт Медицины и Стандартизации»

141070, г. Королев, ул. Фрунзе, д. 1А, пом. III, оф. 208

Телефон: +7 968 353 67 95

e-mail: ooo.niimis@mail.ru

Производитель

Российская Федерация

ООО «Гиппократ», Самарская обл., Красноярский район, пос. Светлое Поле,
Промышленная зона № 12

Тел: (846) 312-59-42, тел./факс: (846) 312-59-37

e-mail: okk@hyppcrat.ru

Российская Федерация

АО «Синтек», Самарская обл., муниципальный район Красноярский, с.п. Светлое Поле,
п. Светлое Поле, зона (массив) Промышленная, зд. 12

Тел: +7 (846) 212-50-65

e-mail: sintek.ao@mail.ru