МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛП-008193-230522
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Геделикс® Кирш

Регистрационный номер:

Торговое наименование:

Геделикс® Кирш

Международное непатентованное или группировочное наименование:

плюща обыкновенного листьев экстракт

Лекарственная форма:

сироп со вкусом вишни и малины

Состав (на 100 мл препарата):

Активный компонент:

Плюща обыкновенного листьев экстракт сухой (4 - 8 : 1) – 700,0 мг.

Вспомогательные вещества:

калия сорбат, камедь ксантановая, мальтитол жидкий, лимонная кислота безводная, ароматизатор вишневый, ароматизатор малиновый, вода очищенная.

Описание

Прозрачный или непрозрачный желтовато-коричневый раствор с фруктовым запахом.

Возможно появление осадка, который исчезает при взбалтывании флакона.

Фармакотерапевтическая группа

Отхаркивающее средство растительного происхождения

Код АТХ

R05CA

Фармакологическое действие

Фармакодинамика

Растительный препарат от кашля. Оказывает отхаркивающее, муколитическое и бронхоспазмолитическое действие. Снижает вязкость мокроты и способствует ее отхождению.

Фармакокинетика

Активным компонентом препарата является сухой экстракт листьев плюща обыкновенного, содержащий сложный комплекс биологически активных веществ, в связи с чем проведение фармакокинетических исследований не представляется возможным.

Показания к применению

В качестве отхаркивающего средства в комплексной терапии острых и хронических воспалительных заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к активному компоненту, к растениям семейства Аралиевых (Araliaceae) или к любому из вспомогательных веществ.

Наследственная непереносимость фруктозы; беременность, период грудного вскармливания.

С осторожностью

Применять с осторожностью у пациентов с гастритом или язвенной болезнью желудка; у пациентов с приступами затрудненного дыхания, гнойной мокротой, мокротой с прожилками крови.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Препарат Геделикс® Кирш сироп со вкусом вишни и малины не рекомендуется применять при беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Препарат Геделикс® Кирш следует принимать внутрь (после еды).

В упаковке препарата на 100 мл находится мерный шприц.

1 мерный шприц соответствует 5 мл.

Использование мерного шприца:

Плотно вставить мерный шприц в горлышко флакона. Перевернуть флакон вверх дном и плавно потянуть поршень вниз, набирая сироп в шприц до нужной отметки. Вернуть флакон в исходное положение и вынуть шприц, аккуратно поворачивая его. Содержимое шприца может быть помещено непосредственно в ротовую полость или перемещено в ложку. После употребления промыть шприц и высушить его.

Если врач не назначил другой режим дозирования, следует придерживаться следующих режимов дозирования:

Дети от 0 до 1 года – 2,5 мл 1 раз в день.

Дети от 1 до 6 лет – 2,5 мл 2 раза в день.

Дети от 6 до 10 лет – 5 мл 2 раза в день.

Взрослые и дети старше 10 лет – 5 мл 3 раза в день.

Перед применением тщательно взболтать флакон.

Взрослым и подросткам препарат Геделикс® Кирш рекомендуемся применять неразбавленным. Грудным и маленьким детям рекомендуется давать разбавленным в небольшом количестве воды.

В период лечения препаратом рекомендуется употреблять достаточное количество жидкости в теплом виде (вода, чай и др.). Курс лечения определяется тяжестью заболевания, минимальный курс лечения составляет 7 дней. Для закрепления терапевтического эффекта рекомендуется после исчезновения симптомов заболевания продолжить терапию еще в течение 2-3 дней. При отсутствии улучшения состояния пациента необходимо обратиться к врачу. Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции, тошнота, рвота, диарея, в редких случаях – боли в эпигастральной области.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Прием дозы, значительно превышающей рекомендованные суточные дозы (больше, чем в 3 раза) может вызвать тошноту, рвоту, диарею.

Лечение: отмена препарата, симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Препарат не следует применять одновременно с противокашлевыми лекарственными средствами, так как это затрудняет отхождение разжиженной мокроты.

Особые указания

При отсутствии терапевтического эффекта на фоне лечения препаратом в течение 7 дней или ухудшения состояния (появление приступов удушья, гнойной или кровавой мокроты при откашливании, повышение температуры) необходимо обратиться к врачу.

Указания для пациентов с сахарным диабетом:

Пациентам с сахарным диабетом необходимо учитывать, что 5 мл препарата соответствует 0,23 хлебных единиц (ХЕ).

Влияние на способность к управлению транспортными средствами, механизмами

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущими механизмами, работа диспетчера, оператора).

Форма выпуска

Сироп со вкусом вишни и малины.

По 100 мл во флаконы темного стекла с пробкой из полиэтилена низкой плотности с отверстием под мерный шприц, который состоит из корпуса из полипропилена и поршня из полиэтилена высокой плотности.

Каждый флакон закрывают крышкой с кольцом для контроля первого вскрытия и вместе с инструкцией по применению и мерным шприцем с делениями помещают в картонную пачку.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Срок хранения после первого вскрытия флакона 6 месяцев.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта

Владелец регистрационного удостоверения

Кревель Мойзельбах ГмбХ

Кревельштрассе 2, 53783 Айторф, Германия

Производитель

Кревель Мойзельбах ГмбХ

Юридический адрес

Кревельштрассе 2, 53783 Айторф, Германия

Место производства

Кревельштрассе 2, 53783 Айторф, Германия

Организация, принимающая претензии потребителей

ООО «Кревель Мойзельбах», Россия

115114, г. Москва, ул. Летниковская д. 10, строение 4, этаж 7, пом. I, комн. 39Г

Тел.: +7 (495) 966 00 94

Генеральный Директор
ООО «Кревель Мойзельбах» Ф.Х. Дизингер

Примечания, которые не печатаются в инструкции по медицинскому применению:

1. Фраза «МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» не печатается в инструкции при производстве.
2. На немецком языке при производстве может быть указан логотип производителя.
3. При производстве возможно наличие цифро-буквенного (на латинице) индивидуального кода продукта; типографского кода автоматической идентификации упаковочного материала для внутреннего пользования; допускается нанесение дополнительных технологических кодов и меток.