ЛП-№(010912)-(РГ-RU) от 11.07.2025

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 09.07.2025 № 17074
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ПЛЮЩА СИРОП

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Плюща сироп

Международное непатентованное или группировочное наименование: Плюща обыкновенного листьев экстракт

Лекарственная форма: сироп

Состав на 100 мл препарата

Активный компонент

Плюща обыкновенного листьев экстракт* (Плюща обыкновенного листьев экстракт густой) с содержанием гедеракозида С в пересчете на сухое вещество 6,75 %	–	0,8000 г

Вспомогательные вещества

Макрогола глицерилгидроксистеарат (Полиоксил-40-гидрогенизированное касторовое масло)	–	0,5000 г
Анисовое масло эфирное	–	0,0150 г
Гидроксиэтилцеллюлоза (гиэтеллоза)	–	0,1500 г
Сорбитол жидкий (некристаллизующийся)	–	50,0000 г
Пропиленгликоль	–	13,8770 г
Глицерол (глицерин)	–	10,0000 г
Вода очищенная	–	39,9605 г

*Плюща обыкновенного листьев экстракт (Плюща обыкновенного листьев экстракт густой) получают из листьев плюща обыкновенного – Hedera helix L., семейство аралиевые – Araliaceae (Евр. Ф., «Плюща листья») экстракцией смесью: спирт 50 % – пропиленгликоль (98 : 2, масс.) при соотношении сырья и конечного продукта (2,2-2,9) : 1.

Описание

Густоватая жидкость от светло-желтого до желтовато-коричневого цвета со слабым характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях; отхаркивающие средства, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами; отхаркивающие средства.

Код АТХ: R05CA12.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 09.07.2025 № 17074
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Оказывает отхаркивающее, муколитическое и бронхоспазмолитическое действие. Снижает вязкость мокроты и способствует ее отхождению.

Фармакокинетика

Препарат представляет собой экстракт из лекарственного растительного сырья (листьев плюща), содержащий сложный комплекс биологически активных веществ, в связи с чем проведение фармакокинетических исследований не представляется возможным.

Показания к применению

В качестве отхаркивающего средства в комплексной терапии острых и хронических воспалительных заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата и растениям семейства аралиевых.

Непереносимость фруктозы, недостаточность аргининосукцинат-синтетазы, беременность и период грудного вскармливания.

Детский возраст до 2 лет (из-за риска ухудшения респираторных симптомов заболевания вследствие приема препарата, обладающего секретолитическим действием).

С осторожностью

Гастрит, язвенная болезнь желудка.

Если у Вас одно из перечисленных заболеваний, перед приемом препарата обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Не рекомендуется применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Если врач не назначил другого режима дозирования, препарат следует принимать внутрь, после еды:

Дети от 2 лет до 4 лет – по 2,5 мл (1/2 чайной ложки) 3 раза в день.

Дети от 4 лет до 10 лет – по 2,5 мл (1/2 чайной ложки) 4 раза в день.

Взрослые и дети старше 10 лет – по 5 мл (1 чайная ложка) 3 раза в день.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 09.07.2025 № 17074
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

Взрослым и детям старше 10 лет препарат рекомендуется принимать неразбавленным.

Детям в возрасте от 2 лет до 10 лет препарат рекомендуется давать разбавленным в небольшом количестве воды.

Длительность применения препарата зависит от тяжести заболевания и определяется врачом индивидуально, но должна составлять не менее 7 дней.

После исчезновения симптомов заболевания рекомендуется продолжить терапию препаратом еще в течение 2-3 дней.

Перед каждым применением препарата флакон необходимо взбалтывать.

Если в период лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции, тошнота, рвота, диарея, в редких случаях – боли в эпигастральной области.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, ***сообщите об этом врачу****.*

Передозировка

При применении препарата в дозах, превышающих рекомендуемые, возможны тошнота, рвота, диарея, гастроэнтерит.

Лечение: отмена препарата, симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Препарат не следует применять одновременно с противокашлевыми лекарственными средствами, так как это затрудняет отхождение разжиженной мокроты.

Особые указания

Не следует превышать рекомендованные дозы препарата.

В случае отсутствия лечебного эффекта на фоне приема препарата в течение 4-5 дней или ухудшения состояния пациента (появление приступов удушья, гнойной мокроты, повышение температуры), следует немедленно обратиться к врачу.

Пациентам с сахарным диабетом необходимо учитывать, что одна чайная ложка сиропа (5 мл) содержит 1,75 г сорбитола (соответствует 0,44 г фруктозы), что соответствует 0,15 ХЕ.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 09.07.2025 № 17074
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

Препарат в качестве вспомогательных веществ содержит, в том числе, пропиленгликоль, сорбитол, глицерол. Пропиленгликоль может вызвать симптомы, схожие с приемом алкоголя. Сорбитол может оказывать слабое слабительное действие. Глицерол может вызывать головную боль, расстройство желудка и диарею.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата не влияет на способность к управлению транспортными средствами и занятию другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Сироп.

По 100 мл во флаконы оранжевого стекла, укупоренные пробками и крышками навинчиваемыми.

По 100 мл во флаконы оранжевого стекла, укупоренные колпачками алюминиевыми с перфорацией с прокладками полимерными.

По 100 мл во флаконы из полиэтилентерефталата коричневого цвета с колпачками из полиэтилена с контролем первого вскрытия.

По 2,5 или 5 мл в однодозовые пакетики из материала комбинированного на основе фольги алюминиевой.

Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

10 или 30 пакетиков вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

При температуре от 15 до 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. После вскрытия флакона – 6 мес.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения/Производитель/Организация, принимающая претензии потребителя

ЗАО «ВИФИТЕХ», Россия

142279, Московская обл., г. Серпухов, п. Оболенск, ГНЦ ПМ.

Тел./факс: (495) 716-15-81, 716-15-90.