

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ПОВИДОН

Регистрационный номер:

Торговое наименование. ПОВИДОН.

Международное непатентованное или группировочное наименование. Повидон.

Лекарственная форма. Порошок для приготовления раствора для приема внутрь.

Состав на один пакет:

Действующее вещество:

Повидон (поливинилпирролидон низкомолекулярный медицинский

12600±2700)

– 2,5 г или 5 г

Описание. Белый или слегка желтоватый порошок со слабым специфическим запахом.

Фармакотерапевтическая группа.

Противодиарейные, кишечные противовоспалительные/противомикробные средства;
кишечные адсорбенты.

Код АТХ. А07ВС

Фармакологические свойства.

Фармакодинамика.

Повидон связывает токсины, поступающие в желудочно-кишечный тракт и образующиеся в организме, и выводит их через кишечник.

Фармакокинетика.

Повидон не всасывается, не метаболизирует, выводится через желудочно-кишечный тракт.

Показания к применению.

В качестве средства дезинтоксикации при токсических формах острых инфекционных желудочно-кишечных заболеваний (дизентерия, сальмонеллезы, пищевые токсикоинфекции), при печеночной и почечной недостаточности.

Противопоказания.

Повышенная чувствительность к повидону.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания.

Достаточного опыта по применению препарата во время беременности и в период грудного вскармливания нет. Возможно применение препарата в период беременности и грудного вскармливания по назначению лечащего врача в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает возможный риск развития осложнений.

Перед применением препарата, если Вы беременны или предполагаете, что Вы могли бы быть беременной, или планируете беременность, необходимо проконсультироваться с врачом. В период грудного вскармливания перед применением препарата необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы.

Внутрь, спустя 1-2 часа после приема пищи или лекарственных препаратов. Препарат растворяют из расчета: 2,5 г порошка в 50 мл холодной кипяченой воды или 5 г порошка в 100 мл холодной кипяченой воды. Для улучшения вкусовых качеств в раствор может быть добавлен сахар или фруктовые соки.

Взрослым по 100 мл приготовленного раствора 1-3 раза в сутки в течение 2-7 дней (до исчезновения симптомов интоксикации).

Особые группы пациентов

Лица пожилого возраста

Коррекции дозы не требуется.

Пациенты с почечной недостаточностью

Коррекции дозы не требуется.

Пациенты с печеночной недостаточностью

Коррекции дозы не требуется.

Дети

Суточный прием для детей:

от 1 до 3 лет – 50 мл приготовленного раствора 2 раза;

от 4 до 6 лет – 50 мл приготовленного раствора 3 раза;

от 7 до 10 лет – 100 мл приготовленного раствора 2 раза;

от 11 до 14 лет – 100 мл приготовленного раствора 3 раза;

от 15 до 18 лет – режим дозирования не отличается от режима дозирования для взрослых.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие.

Быстро проходящие тошнота и рвота (не являются основанием для отмены препарата).

Не исключено развитие аллергических реакций.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка.

В случаях передозировки усиливаются побочные эффекты препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами.

Применение препарата совместно с другими лекарственными препаратами, назначаемыми внутрь, может резко замедлять скорость и/или уменьшать степень их всасывания из желудочно-кишечного тракта.

Если Вы применяете лекарственные препараты (в том числе безрецептурные) перед применением препарата проконсультируйтесь с врачом.

Особые указания.

Приготовленный раствор должен храниться в холодильнике при температуре 4 °С не более трех дней.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами.

Препарат не оказывает влияния на способность к управлению транспортными средствами или занятию другими потенциально опасными видами деятельности.

Форма выпуска.

Порошок для приготовления раствора для приема внутрь, 2,5 г; 5 г.

По 2,5 г или по 5 г в термосвариваемые пакеты из материала упаковочного комбинированного (Б/ПЭ), материала комбинированного «Буфлен» (ПЭ/Ф/ПЭ/Б) или ламинированной бумаги (Б/ПЭ).

По 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 20 или 30 пакетов вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона коробочного для потребительской тары или из картона хром-эрзац для складных коробок или из картона хром-эрзац макулатурного.

По 50, 100, 200, 400 пакетов без пачки вместе с равным количеством инструкций по применению помещают в коробку картонную (для стационаров).

Условия хранения.

При температуре не выше 30 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности.

3 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска.

Отпускают без рецепта.

Производитель/Организация, принимающая претензии:

АО «Ивановская фармацевтическая фабрика», Россия

153007, Ивановская обл., г.о. Иваново, г. Иваново, ул. Генерала Горбатова, д. 19А

Тел.: 8 (493) 233-42-73

E-mail: ivff@yandex.ru