

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО
ПРЕПАРАТА

ЭНТЕРОТОКС

Регистрационный номер:

Торговое наименование: ЭНТЕРОТОКС

Международное непатентованное или группировочное наименование: Повидон.

Лекарственная форма: порошок для приготовления раствора для приема внутрь.

Состав

1 пакет содержит:

Действующее вещество:

Повидон (поливинилпирролидон низкомолекулярный

медицинский 12600 ± 2700)

2,5 г

Описание: Белый или со слегка желтоватым оттенком порошок со слабым специфическим запахом.

Фармакотерапевтическая группа: противодиарейные, кишечные противовоспалительные/противомикробные средства; кишечные адсорбенты; другие кишечные адсорбенты.

Код АТХ: A07BC.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

ЭНЕТРОТОКС, связывает токсины, поступающие в желудочно-кишечный тракт и образующиеся в организме, и выводит их через кишечник.

Фармакокинетика

Не всасывается, не метаболизирует, выводится через желудочно-кишечный тракт.

Показания к применению

Препарат ЭНТЕРОТОКС показан к применению у взрослых и детей в возрасте от 1 года до 18 лет.

В качестве средства дезинтоксикации при токсических формах острых инфекционных желудочно-кишечных заболеваниях (дизентерия, сальмонеллез, пищевые токсикоинфекции), при печеночной и почечной недостаточности.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к повидону.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Достаточного опыта по применению препарата во время беременности и в период грудного вскармливания нет. Возможно применение препарата в период беременности и грудного вскармливания по назначению лечащего врача в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает возможный риск развития осложнений.

Перед применением препарата, если Вы беременны или предполагаете, что Вы могли бы быть беременной, или планируете беременность, необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы

Внутрь, спустя 1 – 2 часа после приема пищи или лекарственных препаратов. Препарат растворяют из расчета: 2,5 г порошка в 50 мл холодной кипяченой воды. Для улучшения вкусовых качеств в раствор может быть добавлен сахар или фруктовые соки.

Взрослым по 100 мл приготовленного раствора 1 – 3 раза в сутки в течении 2 – 7 дней (до исчезновения симптомов интоксикации).

Суточный прием для детей:

от 1 до 3 лет – 50 мл раствора 2 раза;

от 4 до 6 лет – 50 мл раствора 3 раза;

от 7 до 10 лет – 100 мл раствора 2 раза;

от 11 до 14 лет – 100 мл раствора 3 раза;

от 15 до 18 лет – режим дозирования не отличается от режима дозирования для взрослых.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие

Быстро проходящая тошнота и рвота (не является основанием для отмены препарата).

Не исключено развитие аллергической реакции.

Если у вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

В случаях передозировки усиливаются побочные эффекты препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Применение препарата совместно с другими лекарственными препаратами, назначаемыми внутрь, может резко замедлить скорость и/или уменьшить степень их всасывания из желудочно-кишечного тракта.

Если Вы применяете лекарственные препараты (в том числе безрецептурные) перед применением препарата ЭНТЕРОТОКС проконсультируйтесь с врачом.

Особые указания

Приготовленный раствор должен храниться в холодильнике при температуре 4°C не более трех дней.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат не оказывает влияния на способность к управлению транспортными средствами или занятию другими потенциально опасными видами деятельности.

Форма выпуска

Порошок для приготовления раствора для приема внутрь, 2,5 г.

По 2,5 г препарата в пакеты из материала комбинированного многослойного типа Буфлен (Б/ПЭ/Ф/ПЭ бумага - полиэтиленовая пленка – фольга - полиэтиленовая пленка).

По 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 40, 50 пакетов вместе с инструкцией по применению в пачку из картона.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения

ООО «Женел РД», Россия, 249717, Калужская обл., Козельский район, с. Фроловское, ул. Православная, д. 70.

Организация, принимающая претензии потребителя

ОАО «Самарамедпром», Россия, 443070, Самарская обл., г. Самара, ул. Партизанская, д. 86. Тел./факс: (846) 373-81-07, (846) 373-81-08.

Производитель

ОАО «Самарамедпром», Россия, Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Ленина, д. 99Б.

Генеральный директор

ООО «Женел РД»

Воинова А. Д.