

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

**ЭНТЕРОДЕЗ®**

**Регистрационный номер:**

**Торговое наименование:** Энтеродез®

**Международное непатентованное или группировочное наименование:** повидон

**Лекарственная форма:** порошок для приготовления раствора для приема внутрь

**Состав:**

1 пакет содержит:

*Действующее вещество:* поливинилпирролидон низкомолекулярный медицинский  
12600±2700 – 5 г.

**Описание:** белый или слегка желтоватый порошок со слабым специфическим запахом. Гигроскопичен. Раствор, приготовленный в соответствии с инструкцией по применению, представляет собой прозрачную или слабо опалесцирующую, бесцветную или слегка желтоватую жидкость.

**Фармакотерапевтическая группа:** противодиарейные, кишечные противовоспалительные/противомикробные средства; кишечные адсорбенты; другие кишечные адсорбенты.

**Код АТХ:** A07BC

**Фармакологические свойства**

**Фармакодинамика**

Препарат связывает токсины, поступающие в желудочно-кишечный тракт и образующиеся в организме, и выводит их через кишечник.

**Фармакокинетика**

*Абсорбция*

При пероральном применении не всасывается.

*Биотрансформация*

Не подвергается метаболизму.

*Элиминация*

Выводится через желудочно-кишечный тракт.

### **Показания к применению**

Препарат Энтеродез® показан к применению у взрослых и детей в возрасте от 1 года до 18 лет.

В качестве средства дезинтоксикации при токсических формах острых инфекционных желудочно-кишечных заболеваний (дизентерия, сальмонеллезы, пищевые токсикоинфекции), при печеночной и почечной недостаточности.

### **Противопоказания**

Гиперчувствительность к повидону.

### **Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

Достаточного опыта по применению препарата во время беременности и в период грудного вскармливания нет. Возможно применение препарата в период беременности и грудного вскармливания по назначению лечащего врача в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает возможный риск развития осложнений.

### **Способ применения и дозы**

Внутрь, спустя 1-2 часа после приема пищи или лекарственных препаратов. Препарат растворяют из расчета: 2,5 г порошка в 50 мл теплой кипяченой воды или 5 г порошка в 100 мл теплой кипяченой воды. Для улучшения вкусовых качеств в раствор может быть добавлен сахар или фруктовые соки.

Взрослым по 100 мл приготовленного раствора 1-3 раза в сутки в течение 2-7 дней (до исчезновения симптомов интоксикации).

Суточный прием для детей:

от 1 до 3 лет - 50 мл раствора 2 раза;

от 4 до 6 лет - 50 мл раствора 3 раза;

от 7 до 10 лет - 100 мл раствора 2 раза;

от 11 до 14 лет - 100 мл раствора 3 раза;

от 15 до 18 лет - режим дозирования не отличается от режима дозирования для взрослых.

*Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.*

### **Побочное действие**

Быстро проходящая тошнота и рвота (не является основанием для отмены препарата).

Не исключено развитие аллергических реакций.

*Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.*

### **Передозировка**

В случаях передозировки усиливаются нежелательные реакции препарата.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Применение препарата совместно с другими лекарственными препаратами, назначаемыми внутрь, может резко замедлить скорость и/или уменьшить степень их всасывания из желудочно-кишечного тракта.

### **Особые указания**

Приготовленный раствор должен храниться в холодильнике при температуре 4 °С не более трех дней.

### **Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами**

Препарат не оказывает влияния на способность к управлению транспортными средствами или занятию другими потенциально опасными видами деятельности.

### **Форма выпуска**

Порошок для приготовления раствора для приема внутрь.

По 5 г в пакеты из материала комбинированного типа «Буфлен».

По 1, 2, 3, 4, 5 или 6 пакетов вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

### **Условия хранения**

При температуре не выше 30 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности**

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

**Условия отпуска**

Отпускают без рецепта.

**Держатель регистрационного удостоверения**

ООО «АЛВИЛС»

Россия, 109316, г. Москва, Остаповский проезд, д.5/1, стр.1, этаж 6, офис №650

**Производитель**

ООО «ЮжФарм»

Россия, Краснодарский край, муниципальный район Крымский, с.п. Троицкое,  
ст-ца Троицкая, тер. Нефтепромплощадка

Тел: +7 (86131) 5-35-65

АО «Кировская фармацевтическая фабрика»

Россия, 610000, Кировская обл., г. Киров, ул. Московская, д. 27 а

Тел.: (8332) 22-01-26

**Организация, принимающая претензии потребителей**

ООО «АЛВИЛС»

Россия, 109316, г. Москва, Остаповский проезд, д.5/1, стр.1, этаж 6, офис №650

Тел.: +7 (495) 775-71-61

[pv@alvils.ru](mailto:pv@alvils.ru)