

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ЙОДОВИДОН

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Йодовидон

Международное непатентованное или группировочное наименование:

Повидон-йод

Лекарственная форма: суппозитории вагинальные

Состав на один суппозиторий

Действующее вещество:

повидон-йод (йодовидон)

(в пересчете на активный йод – 0,020 г) – 0,20 г

Вспомогательные вещества:

макрогол 400 (полиэтиленоксид 400) – 0,17 г

макрогол 4000 (полиэтиленоксид 4000) – 0,28 г

макрогол 1500 (полиэтиленоксид 1500) – достаточное количество для
получения суппозитория массой
2,25 г

Описание

Суппозитории от светло-коричневого до темно-коричневого с буроватым оттенком цвета, с характерным запахом, торпедообразной формы. Допускается наличие воздушного стержня или воронкообразного углубления.

Фармакотерапевтическая группа: антисептическое средство.

Код АТХ: G01AX11.

Фармакологические свойства

Антисептический препарат. Обладает широким спектром противомикробного действия. Активен в отношении бактерий, в т.ч. кишечной палочки, золотистого стафилококка, грибов, вирусов, простейших. Активное вещество препарата – йод, находится в виде комплекса с поливинилпирролидоном. Препарат относится к йодоформам, которые связывают йод. При контакте с кожей и слизистыми йод постепенно и равномерно высвобождается.

Фармакокинетика

Нет данных о системной абсорбции.

Показания к применению

Острые и хронические инфекционные воспалительные заболевания влагалища (смешанные, неспецифические инфекции), в том числе инфекции влагалища, вызываемые трихомонадами и грибами; предоперационная профилактика осложнений инфекционного генеза в гинекологии.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к йоду и другим компонентам препарата, гипертиреоз и другие нарушения функции щитовидной железы (узловой коллоидный зоб, эндемический зоб, тиреоидит Хашимото), дерматит Дюринга, аденома щитовидной железы, одновременная терапия радиоактивным йодом, детский возраст до 8 лет.

С осторожностью

Хроническая почечная недостаточность, беременность, период грудного вскармливания, пожилой возраст.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение Йодовидона не рекомендуется с II триместра беременности и во время грудного вскармливания. При необходимости в этих случаях лечение возможно под индивидуальным медицинским контролем.

Перед применением препарата, если Вы беременны, или предполагаете, что Вы могли бы быть беременной, или планируете беременность, необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы

Препарат применяют интравагинально. Предварительно освободив суппозиторий от контурной упаковки, его вводят, лежа на спине, глубоко во влагалище. При подострых и хронических вагинитах – перед сном, в течение 14 дней по 1 суппозиторию (независимо от фазы менструального цикла). При острых вагинитах – по 1 суппозиторию 2 раза в день в течение 7 дней. Для предоперационной профилактики осложнений инфекционного генеза в гинекологии препарат вводят интравагинально 2 раза в сутки (утром и вечером перед сном) в течение 1-7 дней.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции по применению.

Побочное действие

Зуд, гиперемия на местах аппликации; аллергические реакции.

В редких случаях препарат может вызывать реакции гиперчувствительности, например, контактный дерматит с образованием псориазоподобных красных мелких буллезных элементов. При возникновении таких явлений применение препарата следует прекратить. Длительное применение повидон-йода может приводить к абсорбции значительных количеств йода. В некоторых случаях описано развитие гипертиреоза, вызванного йодом, преимущественно у пациентов с ранее имевшимся заболеванием щитовидной железы.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Симптомы

Для острой йодной интоксикации характерны: металлический привкус во рту, повышенное слюноотделение, ощущение жжения или боль во рту или глотке; раздражение или отек глаз; кожные реакции; желудочно-кишечные расстройства и понос; нарушение функции почек и анурия; недостаточность

кровообращения; отек гортани со вторичной асфиксией, отек легких, метаболический ацидоз, гипернатриемия.

Лечение

Симптоматическая и поддерживающая терапия с особым вниманием к электролитному балансу, функции почек и щитовидной железы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не следует применять препарат в комплексе с другими дезинфицирующими и антисептическими средствами, содержащими ртуть, окислители, щелочи и катионные поверхностно-активные вещества. Совместное применение повидон-йода и перекиси водорода, а также ферментных препаратов, содержащих серебро и таулоридин, для обработки ран, а также антисептических препаратов, приводит к взаимному снижению эффективности.

Если Вы применяете вышеперечисленные средства или другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные) перед применением препарата проконсультируйтесь с врачом.

Особые указания

В присутствии крови бактерицидное действие препарата может уменьшиться.

В случае неманифестного гипертиреоза и других заболеваний щитовидной железы (особенно у пожилых больных) препарат применяется только по строгим показаниям и под постоянным врачебным контролем. В связи с окислительными свойствами повидон-йода его следы могут приводить к ложноположительным результатам некоторых типов исследований для обнаружения скрытой крови в кале, а также крови или глюкозы в моче. Во время применения повидон-йода может снизиться поглощение йода щитовидной железой, что может повлиять на результаты некоторых диагностических исследований (например, сцинтиграфии щитовидной железы, определения белково-связанного йода, измерений с применением радиоактивного йода), а также может взаимодействовать с препаратами йода, применяемыми для лечения заболеваний щитовидной железы. Для получения

неискаженных результатов сцинтиграфии щитовидной железы после длительной терапии повидон-йодом рекомендуется выдержать достаточно длительный период времени без этого препарата. При нарушении функции щитовидной железы, препарат может применяться только по указанию врача. Если во время курса лечения возникнут симптомы гипертиреоза, необходимо проверить функцию щитовидной железы. Необходимо провести контроль функции щитовидной железы у новорожденных и вскармливаемых грудным молоком младенцев, матери которых применяли Йодовидон. Осторожность следует соблюдать при регулярном применении препарата у пациентов с ранее диагностированной почечной недостаточностью. Следует избегать регулярного применения вагинальных суппозитория Йодовидон у больных, получающих препараты лития. Рекомендуется соблюдать осторожность при введении вагинальных суппозитория девственницам. Суппозитории обладают спермицидным действием, в связи с чем не рекомендуется их применение у лиц, планирующих беременность. Во время применения суппозитория можно рекомендовать использование гигиенических прокладок. Окраска на коже и тканях легко смывается водой. После контакта с препаратом следует избегать его попадания в глаза.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Правильное применение препарата не влияет на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами.

Форма выпуска

Суппозитории вагинальные 200 мг по 5 суппозитория в контурной ячейковой упаковке. Две контурные упаковки вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 15 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения/ Производитель/

Организация, принимающая претензии потребителей:

ЗАО «Алтайвитамины»

659325, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Заводская, 69

тел.: (3854) 338-719, 326-948; факс (3854) 326-943

/ Генеральный директор



А.Ф. Балушкин