

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Йодопирон**Регистрационный номер:****Торговое наименование:** Йодопирон**Международное непатентованное или группировочное наименование:** Повидон-Йод +
[Калия йодид]**Лекарственная форма:** раствор для наружного применения**Состав****1000 мл препарата содержат:***Действующее вещество*

Йод 14,10 г

Вспомогательные вещества

Калия йодид 13,80 г

Повидон К-17 122,10 г

Вода очищенная до 1000 мл

Описание: пленкообразующая темно-коричневая жидкость без запаха или со слабым характерным запахом.**Фармакотерапевтическая группа:** антисептики и дезинфицирующие средства; препараты йода.**Код АТХ:** D08AG**Фармакологические свойства**

Йод в форме комплекса поливинилпирролидона йода. Концентрация активного йода не менее 1 %. Антисептическое средство; при наружном применении оказывает бактерицидное (в отношении широкого спектра грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в т. ч. антибиотикорезистентных штаммов *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus* и *Proteus*), противогрибковое действие.

Показания к применению

Обеззараживание рук хирурга, операционного поля, хирургических перчаток и локтевых сгибов; обработка кожи доноров, лечение ожогов, гнойных и инфицированных ран, остеомиелита.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, гипертиреоз, герпетиформный дерматит Дюринга, аденома щитовидной железы, почечная недостаточность, перед терапией радиоактивным йодом, период новорожденности (особенно у недоношенных детей).

С осторожностью

Детский возраст, беременность, период грудного вскармливания.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Не рекомендуется применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания (при необходимости применение возможно под индивидуальным медицинским контролем).

Способ применения и дозы

Наружно. 0,1-0,5 % водные растворы готовят из 1 % раствора непосредственно перед применением. В качестве антисептика для обработки рук хирурга применяют 0,1 % (по активному йоду) раствор (5 мл); операционное поле протирают салфеткой, смоченной в растворе. При обширных ожогах больного погружают в ванну с раствором 1:32 или 1:50 на 10-15 минут. Для комплексного лечения гнойных и инфицированных ран, остеомиелита, обеззараживания хирургических перчаток и обработки локтевых сгибов доноров применяют 0,5 % и 1 % (по активному йоду) растворы Йодопирона.

Побочное действие

Сухость кожи, аллергические реакции (кожный зуд, гиперемия на местах аппликации, крапивница). При нанесении на обширную раневую поверхность возможно быстропроходящее жжение.

Передозировка

Симптомы: раздражение в месте нанесения.

Лечение: симптоматическое.

Длительное применение (более 7-10 дней) может вызвать явление йодизма («металлический» привкус во рту, повышенное слюноотечение, отеки глаз или гортани и т. д.), при появлении которого следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу. При случайном проглатывании йода возможно поражение слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. Следует промыть желудок 0,5 % раствором натрия тиосульфата; в качестве антидота перорально используют активированный уголь, крахмальный клейстер, мучной отвар, слизистое

питье, молоко и/или внутривенно каждые 4 часа 10 мл 10 % раствора натрия тиосульфата, а также симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Фармацевтически несовместим с дезинфицирующими средствами, содержащими ртуть, окислителями, солями щелочей и веществами с кислой реакцией, с лекарственными средствами для наружного применения, содержащими ферменты (йод снижает активность ферментов). В присутствии крови бактерицидное действие может уменьшиться. При одновременном применении с препаратами лития возможен синергетический гипотиреоидный эффект.

Особые указания

Избегать попадания раствора в глаза.

Не нагревать перед применением.

Не использовать при укусах насекомых, домашних и диких животных.

Во время применения индикаторные бумаги для обнаружения скрытого кровотечения в стуле и моче могут показать ложноположительные результаты вследствие сильного окислительного действия повидон-йода.

Окраска на коже и тканях легко смывается водой.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Не влияет на способность управлять транспортным средством и заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания.

Форма выпуска

Раствор для наружного применения 1 %.

По 10 мл, 15 мл, 20 мл, 25 мл, 30 мл, 40 мл, 50 мл или 100 мл помещают во флаконы из полиэтилена с полимерной крышкой или во флаконы из оранжевого стекла, укупоренные крышками с пробками или крышками с контролем вскрытия или без него из ПВД или ПНД. Каждый флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

Допускается комплектация флаконов на 50 мл и 100 мл вместе с насадкой-распылителем.

50, 100, 150, 200, 300 флаконов по 10 мл, 15 мл, 20 мл, 25 мл или 30 мл; 30, 50, 80, 100, 120, 150 флаконов по 40 мл или 50 мл; 30, 50, 80, 100 флаконов по 100 мл вместе с равным количеством инструкций по медицинскому применению помещают в коробку из картона (для стационаров).

По 100 мл, 200 мл, 300 мл, 400 мл, 500 мл или 1000 мл помещают в бутылки из стекломассы, закупоренные пробками резиновыми и колпачками алюминиевыми для закупорки лекарственных средств; или во флаконы из полиэтилентерефталата (для стационаров).

По 3 л, 5 л или 10 л в канистры полиэтиленовые (для стационаров).

20, 30, 50, 60, 80, 100 бутылок или флаконов по 100 мл; 10, 20, 30, 50 бутылок или флаконов по 200 мл; 10, 15, 30 бутылок или флаконов по 300 мл; 10, 15, 20 бутылок или флаконов по 400 мл; 6, 12, 18 бутылок или флаконов по 500 мл; 6, 8, 9, 10 бутылок или флаконов по 1000 мл вместе с равным количеством инструкций по медицинскому применению помещают в коробку из картона (для стационаров).

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения / Организация, принимающая претензии потребителей

Российская Федерация.

Акционерное общество «Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод» (АО «Усолье-Сибирский химфармзавод»).

665452, Иркутская обл., г.о. город Усолье-Сибирское, тер. Промышленный массив, ул. Индустриальная, зд. 62.

Тел.: +7 (395) 435-89-08.

Электронная почта: usolpharm@usolpharm.ru

Производитель

Российская Федерация.

Акционерное общество «Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод» (АО «Усолье-Сибирский химфармзавод»).

665452, Иркутская обл., г.о. город Усолье-Сибирское, тер. Промышленный массив, ул. Индустриальная, зд. 62.