ЛП-№(011262)-(РГ-RU) от 08.08.2025

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 05.08.2025 № 19416
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ПОДОРОЖНИКА БОЛЬШОГО СОК

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Подорожника большого сок

Международное непатентованное или группировочное наименование: Подорожника большого листьев свежих сок

Лекарственная форма: сок

Состав

Для приготовления препарата необходимо:

Подорожника большого листьев свежих	–	достаточное количество для получения 77 мл сока неконсервированного
Спирта этилового 95 % (этанол)	–	достаточное количество до получения 100 мл препарата

Описание

Жидкость от коричневого до темно-коричневого цвета с характерным запахом. При хранении допускается появление осадка.

Фармакотерапевтическая группа

Стимулятор репарации тканей растительного происхождения.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Стимулирует секрецию желудочного сока, повышает его кислотность, оказывает ранозаживляющее, противовоспалительное и кровоостанавливающее действие, обладает спазмолитическими свойствами.

Фармакокинетика

Данные отсутствуют.

Показания к применению

Хронический гипоацидный гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки при нормальной или пониженной кислотности, хронический колит (в комплексном лечении); в качестве средства, повышающего аппетит.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 05.08.2025 № 19416
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, гиперацидный гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки при повышенной кислотности, заболевания печени, алкоголизм, эпилепсия, черепно-мозговые травмы, заболевания головного мозга, беременность, период грудного вскармливания, возраст до 18 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Внутрь, по 1 столовой ложке, разведенной в 1/4 стакана воды, 3 раза в день за 15-30 минут до еды. Перед применением взбалтывать. Курс лечения 30 дней.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции, изжога.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, ***сообщите об этом врачу.***

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки не выявлено.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не описано.

Особые указания

Препарат содержит не менее 21,0 % этанола. Содержание абсолютного этилового спирта (этанола) в максимальной разовой дозе препарата (15 мл) составляет около 2,5 г, в максимальной суточной дозе (45 мл) – около 7,5 г.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

В период лечения необходимо воздержаться от управления транспортными средствами и занятий другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 05.08.2025 № 19416
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

Форма выпуска

Сок.

По 100 мл во флаконы оранжевого стекла, укупоренные пробками и крышками навинчиваемыми.

По 100 мл во флаконы оранжевого стекла, укупоренные колпачками алюминиевыми с перфорацией с прокладками полимерными.

По 100 мл во флаконы из полиэтилентерефталата коричневого цвета с колпачками системы контроля первого вскрытия.

Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 15 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель

ЗАО «ВИФИТЕХ», Россия

Московская обл., г. Серпухов, п. Оболенск, тер. Квартал А, д. 14.

Держатель регистрационного удостоверения/Организация, принимающая претензии потребителей

ЗАО «ВИФИТЕХ», Россия

142279, Московская обл., г. Серпухов, п. Оболенск, ГНЦ ПМ.

Тел.: (495) 716-15-81, 716-15-90.