ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

ПЛАНТАЦИД

PLANTACIDUM

Регистрационный номер:

Торговое название: ПЛАНТАЦИД

Лекарственная форма:

Гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь.

Описание

Гранулы от светло-коричневого с сероватым оттенком до темно-коричневого с сероватым оттенком или темно-серого цвета, со слабым специфическим запахом.

Состав

В 1 пакете (2 г гранул):

Активный ингредиент: плантаглюцид (сумма полисахаридов листьев подорожника большого), с содержанием суммы восстанавливающих сахаров от 9 % до 20 % – 1 г.

Вспомогательное вещество: сахар-рафинад (сахароза) – 1 г.

Фармакотерапевтическая группа: спазмолитическое средство растительного происхождения.

Код АТС А03.

Фармакологические свойства

Плантацид – спазмолитическое средство растительного происхождения, представляет собой суммарный препарат из листьев подорожника большого (Plantago major L.). Содержит смесь полисахаридов.

Снижает тонус гладких мышц желудка и кишечника, оказывает умеренное противовоспалительное действие, уменьшает отечность складок слизистой оболочки желудка. Усиливает секрецию желудочного сока, повышая его кислотность.

Показания к применению

Гипоацидный гастрит.

Противопоказания

-Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата;

-Гиперацидный гастрит;

-Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения.

Беременность и лактация: Информация о применении препарата у беременных и в период кормления грудью отсутствует.

Способ применения и дозы

Назначают внутрь, за 20 – 30 мин до еды, разводя перед приемом в ¼ стакана теплой воды.

Взрослым и детям старше 12 лет назначают по 1 пакету 2 – 3 раза в сутки.

Детям в возрасте от 6 до 12 лет назначают по ½ пакета 2 – 3 раза в сутки, детям младше 6 лет – ¼ пакета 2 – 3 раза в сутки.

Длительность курса лечения – 3 – 4 нед.

Для профилактики рецидивов препарат применяют в тех же дозах 1 – 2 раза в сутки в течение 1 – 2 мес.

Побочное действие

Препарат обычно хорошо переносится пациентами. Иногда возможны аллергические реакции, изжога.

Передозировка

При передозировке возможно усиление побочных эффектов. *Лечение:* отмена препарата, симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Данные о взаимодействии препарата с другими лекарственными средствами отсутствуют.

Особые указания

Больным сахарным диабетом следует учитывать, что 1 пакет препарата содержит 1 г сахара-рафинада.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами. Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и на выполнение потенциально опасных видов деятельности.

Форма выпуска

Гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь по 2 г.

По 2 г в пакеты (№1) или в пакеты спаренные (№2). По 4, 10, или 30 пакетов №1, или по 4

(2 спаренных пакета №2), или по 20 (10 спаренных пакетов №2), или 25 (12 спаренных пакетов №2 и 1 пакет №1) пакетов вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

При температуре от 15 °С до 25 °С, в сухом и недоступном для детей месте.

Срок годности

5 лет. Не использовать препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель:
ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье", Украина
Претензии потребителей направлять в адрес производителя.
61013, г. Харьков, ул. Шевченко, 22.

И.о. директора ИДКЭЛС **А. Н. Васильев**

Генеральный директор
ООО «Фармацевтическая компания «Здоровье» **А. В. Доровской**