

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ПОДОРОЖНИКА СИРОП

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Подорожника сироп

Международное непатентованное или группировочное наименование: Подорожника ланцетовидного листьев экстракт

Лекарственная форма: сироп

Состав на 100 г препарата*Активный компонент*

Подорожника ланцетовидного листьев экстракт* (Подорожника ланцетовидного листьев экстракт жидкий)	— 5,00 г
--	----------

Вспомогательные вещества

Сахароза	— 64,72 г
Мед натуральный	— 2,00 г
Калия сорбат (Е 202)	— 0,15 г
Мяты перечной листьев масло (Мяты перечной масло)	— 0,01 г
Вода очищенная	— 28,12 г

*Фармацевтическую субстанцию подорожника ланцетовидного листьев экстракт получают из исходного лекарственного растительного сырья: цельных или фрагментированных, высушенных листьев и черешков многолетнего травянистого растения подорожника ланцетовидного – *Plantago lanceolata* L., семейство подорожниковые – *Plantaginaceae*, путем экстрагирования спиртом этиловым 20 % при соотношении сырья и конечного продукта 1 : 1.

Описание

Густоватая жидкость от светло-коричневого до коричневого цвета с характерным запахом. Допускается наличие опалесценции.

Фармакотерапевтическая группа

Препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях; отхаркивающие средства, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами; отхаркивающие средства.

Код АТХ

R05CA.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Оказывает отхаркивающее, противовоспалительное и муколитическое действие.

Фармакокинетика

Данные отсутствуют.

Показания к применению

Воспалительные заболевания дыхательных путей, сопровождающиеся кашлем с трудноотделяемой мокротой – в составе комплексной терапии.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Повышенная чувствительность к продуктам пчеловодства. Гиперсекреция желудочного сока, гиперацидный гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в период обострения. Дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, детский возраст до 1 года.

С осторожностью

Сахарный диабет. Лицам, находящимся на диете с пониженным содержанием углеводов. *Если у Вас одно из перечисленных заболеваний, перед приемом препарата обязательно проконсультируйтесь с врачом.*

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы

Внутрь, запивая небольшим количеством воды.

Детям от 1 года до 6 лет – по 1/2 чайной ложки (2,5 мл) каждые 3-4 ч, но не более 4 раз в сутки.

Детям от 6 лет до 18 лет – по 1 чайной ложке (5 мл) каждые 2-3 ч, но не более 4 раз в сутки.

Взрослым – по 1 столовой ложке (15 мл) каждые 2-3 ч.

Длительность курса лечения – 2-3 недели. Увеличение продолжительности и проведение повторного курса лечения возможно после согласования с врачом.

Если в период лечения улучшения не наступает, или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции. В случае необходимости, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед применением лекарственного препарата.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции, в редких случаях – изжога.

Если любые из указанных в инструкции побочных действий усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки не зарегистрировано.

При применении препарата в дозах, превышающих рекомендуемые, возможно усиление дозозависимых побочных эффектов.

Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не следует применять одновременно с противокашлевыми препаратами и лекарственными средствами, уменьшающими образование мокроты, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

Если Вы применяете вышеперечисленные или другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные), перед применением препарата Подорожника сироп проконсультируйтесь с врачом.

Особые указания

Препарат содержит углеводы, что необходимо учитывать пациентам с сахарным диабетом, а также при гипокалорийной диете.

В одной чайной ложке сиропа (5 мл) содержится около 4,2 г углеводов (0,35 ХЕ). Если при применении препарата симптомы сохраняются без улучшения более 7 дней или ухудшаются, следует обратиться к врачу.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата не оказывает влияния на способность к управлению транспортными средствами и занятию другими потенциально опасными видами

деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Сироп.

По 100 мл во флаконы оранжевого стекла, укупоренные пробками из полиэтилена высокого давления и крышками навинчиваемыми белого цвета из полиэтилена высокого или низкого давления.

По 100 мл во флаконы оранжевого стекла, укупоренные колпачками алюминиевыми с перфорацией с прокладками полимерными.

По 100 мл во флаконы из полиэтилентерефталата коричневого цвета с колпачками из полиэтилена низкого давления с контролем первого вскрытия.

Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона для потребительской тары.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель

ЗАО «ВИФИТЕХ», Россия

Московская обл., г. Серпухов, п. Оболенск, тер. Квартал А, д. 14.

Держатель регистрационного удостоверения/Организация, принимающая претензии потребителей

ЗАО «ВИФИТЕХ», Россия

142279, Московская обл., г. Серпухов, п. Оболенск, ГНЦ ПМ.

Тел.: (495) 716-15-81, 716-15-90.